

循环系统历年真题

1. 颈静脉怒张及肝颈静脉回流征阳性提示（2019）

- A. 左心衰竭
- B. 心肌炎
- C. 全心衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 心肌病

2. 心脏复苏的首选药物为（2019）

- A. 氯化钙
- B. 阿托品
- C. 碳酸氢钠
- D. 利多卡因
- E. 肾上腺素

3. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者最常见的心律失常是（2019）

- A. 室性早搏
- B. 心房颤动
- C. 窦性心动过速
- D. 房室传导阻滞
- E. 室上性心动过速

4. 患儿男，3岁，自1岁时出现活动后气促，乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左缘第2~4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，可见杵状指，首先考虑（2019）

- A. 房间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 室间隔缺损
- E. 右位心

5. 下肢静脉曲张的好发人群不包括（2019）

- A. 警察
- B. 运动员
- C. 空姐
- D. 医生
- E. 服务员

6. 治疗急性心肌梗死并发的室性心率失常宜选用（2019）

- A. 乙胺碘呋酮
- B. 苯妥英钠
- C. 利多卡因
- D. 双异丙吡胺
- E. 维拉帕米

- 7.为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时, 输液速度宜控制在(2019)
- A.10~20 滴/分钟
 - B.20~30 滴/分钟
 - C.30~40 滴/分钟
 - D.40~50 滴/分钟
 - E.50~60 滴/分钟
- 8.患者, 男性, 45 岁, 因间断胸闷一周, 1 天前于夜间突然被迫坐起, 频繁咳嗽, 严重气急, 咳大量粉红色泡沫痰, 既往患冠心病 10 年, 对该患者正确的护理是(2019)
- A.多食蔬菜水果
 - B.端坐位, 背部靠物支撑, 双腿下垂
 - C.给温开水饮用
 - D.将硝酸甘油快速静脉推注
 - E.与麻醉科联系给予气管插管
- 9.一个工人长期在冷库工作, 近日出现下肢肿胀, 疼痛, 足背动脉搏动消失, 应考虑哪种疾病(2019)
- A.大隐静脉曲张
 - B.小隐静脉曲张
 - C.血栓闭塞性脉管炎
 - D.下肢静脉曲张
 - E.下肢深静脉曲张
- 10.卡托普利最常见的副作用为(2018)
- A.心率减慢
 - B.呕吐
 - C.乏力
 - D.头痛
 - E.刺激性干咳
- 11.患者急性心肌梗死后,室性心律失常最常发生的时间是(2018)
- A.立刻
 - B.2 小时内
 - C.6 小时内
 - D.12 小时内
 - E.24 小时内
- 12.患者,男性,45 岁。胸部压榨性疼痛 2 小时,明显烦躁,大汗伴濒死感,急诊入院。下列哪一项护理措施是错误的(2018)
- A.应用洋地黄类药物
 - B.静脉注射吗啡
 - C.绝对卧床休息
 - D.给予氧气吸入
 - E.密切观察生命体征
- 13.患者,男,39 岁。因心力衰竭入院。轻微活动后出现呼吸困难,休息后不易缓解。此病人心功能分级为(2018)

A.心功能正常

B. I 级

C. II 级

D. III 级

E. IV 级

心功能分级

14.感染性心内膜炎最重要诊断方法为(2018)

A.心电图

B.超声

C.X 线片

D.血培养

E.C-反应蛋白

15.患者,女,27 岁,妊娠 37 周,近日诉左下肢酸胀、疼痛,小腿内侧出现团块状隆起,晨起时消失,该患者出现了(2018)

A.血栓闭塞性脉管炎

B.深静脉血栓

C.下肢静脉曲张

D.妊娠所致的钙缺乏

E.下肢软组织感染

16.患者男,45 岁。因“感染性心内膜炎”入院治疗。住院期间心脏超声提示巨大赘生物,为预防栓塞,责任护士对该患者进行健康教育,不正确的是(2018)

A.卧床休息,适当活动

B.突发胸痛、气急,考虑外周肺动脉栓塞的可能

C.出现肢体突然剧烈痛,考虑外周动脉栓塞的可能

D.出现腰痛、血尿,考虑肾栓塞的可能

E.出现失语、吞咽困难等提示脑血管栓塞

17.判断心肺复苏是否有效的指标,不正确的一项是(2018)

A.大动脉出现搏动

B.瞳孔缩小

C.血压恢复正常

D.有呼吸动作

E.面色转红

18.为防止青紫型先天性心脏病患儿发生血管栓塞,出现高热时应采取的护理措施是(2018)

A.绝对卧床休息

B.多喝水或静脉补液

C.吸氧

D.减少活动量

E.避免哭闹

19.老年人在做健身体操时突发心绞痛,立即含服硝酸甘油 2 片,(0.6 mg),1 分钟后眼前发黑,恶心,手心发凉。此时应指导其(2018)

A.活动四肢

B.喝热开水

C.躺下平卧

D.再含一片硝酸甘油

E.站立不动,待自行恢复

20.对心功能不全的患者进行饮食指导,正确的是(2017)

A.在应用排钠利尿剂时,应严格限制钠盐的摄入

B.以清淡易消化的饮食为主

C.服用螺内酯利尿时应鼓励患者多摄入含钾食物,如鲜橙汁、香蕉等

D.可适当增加热量的摄入

E.重度心力衰竭患者每日的钠盐摄入量应小于6克

21.患者女,27岁。心慌气短8年,反复咯血2年,近2日咯血不止。查体:双颊紫红,唇发绀,心率120次/分;心尖区有舒张期杂音;下肢无浮肿,肝脾不大,患者出现心尖区舒张期杂音的最可能原因是(2017)

A.二尖瓣关闭不全

B.肺动脉瓣狭窄

C.心包炎

D.主动脉瓣狭窄

E.二尖瓣狭窄

22.患儿男,7岁。自幼气促,今日在学校剧烈活动后出现晕厥,门诊查体:胸骨左缘第2肋间可闻及粗糙喷射样收缩期杂音,为进一步明确诊断,最有价值的检查是(2017)

A.核磁共振

B.心电图

C.胸部X线

D.彩色多普勒超声

E.CT

23.患者男,72岁。突发呼吸困难,端坐呼吸,自诉胸闷、气促、烦躁不安。查体:血压196/110 mmHg,呼吸30次/分,脉搏140次/分,肺底部可闻及干、湿啰音,心律齐,双下肢未见水肿。最可能的诊断是(2017)

A.高血压脑病

B.右心衰

C.左心衰

D.呼吸衰竭

E.全心衰

24.肥厚心肌病是以哪个部位肥厚为特征(2017)

A.①+③

B.①+②

C.②+④

D.①

E.③+④

25.患者男,45岁。梗阻性肥厚型心肌病,病情稳定。今日来院复查时测血压为150/90 mmHg,护士应指导患者避免使用(2017)

A.氢氯噻嗪

B.硝酸甘油

- C.阿替洛尔
- D.美托洛尔
- E.硝苯地平

26.患儿男,3岁。青紫型先心病,准备择期手术,护士在护理患儿时要注意保证入量,防止脱水,其目的是防止(2017)

- A.肾功能衰竭
- B.休克
- C.心力衰竭
- D.形成血栓
- E.便秘

27.某心脏病患者坚持自测脉搏并随时记录,但最近其在做过心电图后发现自己的心率与脉率不一致,心率90次/分,脉率为75次/分。出现该现象最可能的原因是(2017)

- A.患者颅内压过高
- B.患者自测脉搏方法有误
- C.患者出现了洋地黄中毒
- D.患者发生了心房颤动
- E.患者发生了三度房室传导阻滞

28.诊断心律失常最有效的检查方法是(2016)

- A.心电图
- B.心电向量图
- C.心尖搏动图
- D.超声心动图
- E.心脏磁共振

29.慢性左心功能不全最早出现的症状是(2016)

- A.劳力性呼吸困难
- B.心源性哮喘
- C.水肿
- D.咳粉红色泡沫样痰
- E.食欲降低

30.我国缩窄性心包炎最常见的病因是(2016)

- A.创伤
- B.肿瘤
- C.结核菌感染
- D.化脓性细菌感染
- E.非特异性感染

31.主动脉瓣狭窄患者的突出临床表现是(2016)

- A.胸痛伴晕眩
- B.乏力、下肢水肿
- C.呼吸困难、心绞痛和晕厥
- D.乏力、水肿、黑蒙
- E.咯血伴声音嘶哑

32.患者男,34岁。左足麻木、疼痛、走路时小腿酸胀,易疲劳、足底有硬胀感,初步诊断为血栓闭塞性脉管炎,

可确诊的辅助检查是(2016)

- A. 肢体抬高实验
- B. 静脉注射碳酸镁 10 mL
- C. 仔细检查肢体各动脉搏动情况
- D. 行交感神经阻滞
- E. 行动脉造影

33. 患者女,3岁。患法洛四联症,患儿住院治疗,护士建议其家长该患儿最佳的手术时机是(2016)

- A. 立即
- B. 择期
- C. 5~9岁
- D. 成年后
- E. 学龄前期

34. 患者女,32岁。因心悸、水肿、端坐呼吸入院,诊断为肥厚型心肌病。护士采集健康史时,针对病因,首先应询问的是患者有无(2016)

- A. 应用化疗药物
- B. 病毒感染史
- C. 家居装修史
- D. 酗酒史
- E. 家族史

35. 患者男,72岁。因急性前壁心肌梗死收入院。入院后已行面罩吸氧,建立静脉通路,心电监护示频发多源性室性早搏,护士在床边准备抢救用品,最重要的是(2016)

- A. 血氧饱和度仪
- B. 气管切开包
- C. 吸痰器
- D. 除颤仪
- E. 呼吸机

36. 患者女,27岁。类风湿性瓣膜病,二尖瓣狭窄伴关闭不全2年,1周前因感冒后病情加重入院治疗,不正确的护理措施是(2016)

- A. 空腹服用阿司匹林
- B. 定时测体温,注意热型
- C. 卧床休息减少活动
- D. 进食高热量、高蛋白、清淡易消化饮食
- E. 保持口腔清洁

37. 患儿男,3岁。哭闹时出现口唇发绀,听诊闻及胸骨左缘收缩期杂音,考虑为先天性心脏病。最具有诊断价值的检查是(2016)

- A. 心电图
- B. X线检查
- C. 超声心动图
- D. 血常规检查
- E. 心肌标志物检查

38. 三尖瓣的解剖位置在(2016)

- A. 左心室和主动脉之间

- B.右心室和肺动脉之间
- C.左心房和左心室之间
- D.右心房和右心室之间
- E.主动脉和肺动脉之间

39.频发早搏的心律失常患者,不可饮用浓茶主要是为了避免(2016)

- A.影响铁的摄入
- B.过多液体的摄入
- C.过多咖啡因的摄入
- D.过多 K⁺的摄入
- E.过多 Ca²⁺的摄入

40.患儿女,9岁。患有先天性心脏病,应用强心苷类药物治疗。护士对其家长进行有关饮食营养的健康教育时,应强调多给患儿进食(2016)

- A.富含钠的食物
- B.富含钾的食物
- C.富含钙的食物
- D.富含镁的食物
- E.富含铁的食物

41.某患者因腹泻、呕吐入院,心电图:ST段水平压低,T波倒置,U波增高最可能的原因是(2016)

- A.高钾血症
- B.低钾血症
- C.高钙血症
- D.洋地黄效应
- E.洋地黄中毒

42.患者女,30岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄10年。近一个月常于夜间憋醒,呼吸深快,伴有哮鸣音,端坐后可稍缓解。对夜间易发生喘憋的机制,正确的叙述是(2016)

- A.平卧回心血量增加
- B.膈肌抬高/下降
- C.交感神经张力增加
- D.小支气管舒张
- E.全身小动脉痉挛

43.患者,男,70岁。冠心病史15年。活动后出现心前区压榨样疼痛2小时。首选的治疗措施是(2014)

- A.口服安体舒通
- B.嚼服达喜
- C.肌肉注射杜冷丁
- D.舌下含服硝酸甘油
- E.口服扑尔敏

44.患者,男,8岁。偏瘫卧床3年。近日出现小腿疼痛、肿胀、苍白。疑深静脉血栓形成,社区护士指导家属禁

止按摩患肢,其目的是 (2014)

- A.预防出血
- B.防止血栓脱落
- C.促进静脉回流
- D.缓解疼痛
- E.减轻水肿

45.患者,女,50岁。最近血压波动在 (160~170) / (90~95) mmHg,诊断为高血压,属于 (2014)

- A.舒张期高血压
- B.收缩期高血压
- C.1级高血压
- D.2级高血压
- E.3级高血压

血压水平分类和定义(中国高血压防治指南 2010)

46.一般认为心脏骤停多长时间会出现脑水肿 (2015)

- A.1分钟
- B.2分钟
- C.3分钟
- D.10分钟
- E.15分钟

47.心室颤动患者的脉搏特征是 (2015)

- A.快而规则
- B.慢而规则
- C.快而不规则
- D.慢而不规则
- E.摸不到

48.窦性心动过速是指心率大于 (2015)

- A.80次/分钟
- B.100次/分钟
- C.120次/分钟
- D.160次/分钟
- E.180次/分钟

49.患者,男,43岁。踢球时突感左臂及心前区剧痛,有濒死感,就地休息30分钟未缓解,伴烦躁不安,恶心,出冷汗,急送至急诊科,心电监护示多导联ST段弓背状抬高,T波倒置,可见异常深宽Q波,最可能发生了 (2015)

- A.稳定型心绞痛

- B.急性心包炎
- C.急性心肌梗死
- D.心脏神经官能症
- E.急性主动脉夹层动脉瘤

50.风湿性心脏病二尖瓣狭窄发生栓塞最常累及的部位是（2015）

- A.脑
- B.肾
- C.肠
- D.肺
- E.肝

51.听诊时为清楚的听到急性心包炎患者的心包摩擦音,患者应采取的体位是（2015）

- A.端坐位
- B.坐位且身体后仰
- C.坐位且身体前倾
- D.右侧卧位
- E.左侧卧位

52.患者接受冠状动脉造影术后回到病房,医嘱沙袋压迫股动脉穿刺点 6 h,为防止局部出血和栓塞护士应重点观察（2015）

- A.呼吸
- B.心率
- C.血压
- D.足背部动脉搏动
- E.肌力

53.患者,男,70岁。高血压 10 年。今在服用降压药物后出现头晕,恶心乏力。查体: 血压 110/70 mmHg,脉搏 106 次/分,目前最主要的处理措施是（2015）

- A.吸氧
- B.肌注止吐剂
- C.心电监护
- D.加服降压药物
- E.安置头低足高位

54.胸部 X 线检查心影成梨形提示（2015）

- A.心包积液
- B.三尖瓣关闭不全
- C.二尖瓣关闭不全
- D.二尖瓣狭窄
- E.主动脉瓣狭窄

55.患者,男,38岁。感染性心内膜炎。患者住院期间突然出现失语、吞咽困难、瞳孔大小不等,神志模糊。最可能出现的并发症是(2015)

- A.脑栓塞
- B.肾栓塞
- C.肺栓塞
- D.脾栓塞
- E.肝栓塞

56.扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是(2015)

- A.室间隔肥厚
- B.心室容积减少
- C.单侧或双侧心腔扩大
- D.左心室肥厚
- E.右心室流出道梗阻

(57~58)患者,男,62岁。高血压10年。夜间睡眠中突然憋醒,大汗淋漓,被迫坐起,喘息,咳粉红色泡沫痰,双肺闻及广泛哮鸣音,给予乙醇湿化吸氧。(2014)

57.采用乙醇湿化吸氧的目的是

- A.湿化气道
- B.净化气道
- C.降低通气阻力
- D.降低肺泡表面张力
- E.降低肺泡内泡沫的表面张力

患者,男,62岁。高血压10年。夜间睡眠中突然憋醒,大汗淋漓,被迫坐起,喘息,咳粉红色泡沫痰,双肺闻及广泛哮鸣音,给予乙醇湿化吸氧。(2014)

58.乙醇的浓度是

- A.20%~30%
- B.30%~40%
- C.40%~50%
- D.50%~60%
- E.60%~80%

(59~61)患者,男,52岁,因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图:急性广泛前壁心肌梗死。(2015)

59.升高最早也是恢复最早的心肌损伤标记物是

- A.门冬氨酸转移酶
- B.乳酸脱氢酶
- C.肌酸磷酸激酶
- D.碱性磷酸酶
- E.谷氨酸转移酶

患者,男,52岁,因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图:急性广泛前壁心肌梗死。(2015)

60.为减轻患者疼痛,首选的药物是

- A.安定
- B.阿司匹林
- C.吗啡
- D.硝酸甘油
- E.心痛定

患者,男,52岁,因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图:急性广泛前壁心肌梗死。(2015)

61.最有可能导致患者24小时内死亡的原因是

- A.右心衰竭
- B.心源性休克
- C.室颤
- D.心脏破裂
- E.感染

消化系统历年真题

1.分泌碱性黏液,保护胃黏膜的细胞是(2019)

- A.胃主细胞
- B.胃黏液细胞
- C.胃腺壁细胞
- D.胃窦部G细胞
- E.胃壁平滑肌细胞

2.上下消化道的分界线是

- A.食管穿膈处
- B.回肠
- C.十二指肠空肠曲
- D.十二指肠乳头
- E.屈氏韧带

3.患者女,51岁。因淋巴瘤入院接受治疗。护士在评估患者时发现其口腔黏膜有乳白色分泌物,在给予口腔护理时首选的溶液是(2019)

- A.朵贝尔溶液
- B.1%~4%的碳酸氢钠溶液
- C.0.1%醋酸溶液
- D.1%~3%的过氧化氢溶液
- E.生理盐水

4.婴儿口腔出现白色膜状物,棉签擦去是红色,婴儿疼痛哭闹,属于(2019)

- A.真菌感染
- B.病毒感染
- C.金黄色链球菌感染
- D.细菌感染
- E.支原体感染

5. 患儿女, 1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口(2015)

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

6. 患者男, 43 岁。上腹部隐痛, 腹胀, 嗝气 1 年。胃镜检查报告: 慢性浅表性胃炎, 胃粘膜检测出幽门螺杆菌。对促进疾病康复最根本的护理措施是 (2017)

- A. 观察并记录患者每天进餐的次数、量
- B. 遵医嘱给予抗幽门螺杆菌感染治疗
- C. 及时向患者及家属介绍本病的病因
- D. 嘱患者卧床休息, 保持心态平和
- E. 指导患者食用富含营养、有足够热量的食物

7. 患者, 女性, 31 岁。上腹疼痛 2 年, 疼痛发作与情绪、饮食有关, 查体: 上腹部轻压痛, 拟诊慢性萎缩性胃炎, 要明确诊断则最可靠的检查是(2018)

- A. 胃镜
- B. B 超
- C. X 线钡餐透视
- D. 粪便潜血检验
- E. 食管 pH 值检测

8. 患者男, 63 岁。慢性胃炎, 幽门螺杆菌 (+)。需采用抗菌药物治疗。其用药原则是(2016)

- A. 剂量宜大
- B. 宜静脉给药
- C. 联合用药
- D. 宜长期使用
- E. 药物种类不受限制

9. 与消化性溃疡发病相关的因素是 (2019)

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 十二指肠肠壁薄弱
- C. 习惯性便秘
- D. 十二直肠粘膜萎缩
- E. 家族遗传

10. 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 球部
- B. 乳头的近段降部
- C. 水平部
- D. 升部
- E. 回旋部

11. 消化性溃疡特征性的临床表现是(2014)

- A. 黄疸

- B.食欲下降
- C.恶心、呕吐
- D.反酸、暖气
- E.节律性和周期性上腹痛

12.患者男,36岁。空腹时上腹饥饿样疼痛3年,进食后可明显缓解,冬春季节好发,对其饮食指导正确的是(2017)

- A.多饮牛奶
- B.增加粗纤维蔬菜
- C.少食多餐
- D.睡前进食
- E.禁碱性食物

13.患者,女性,39岁。餐后3小时突觉上腹部刀割样剧痛,持续性,伴恶心入院,急诊护士查体:腹式呼吸消失,移动性浊音阳性,全腹压痛、反跳痛、肌紧张,上腹为甚。考虑为(2018)

- A.胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- B.胃溃疡出血
- C.十二指肠溃疡出血
- D.胃溃疡癌变
- E.胆囊炎

14.十二指肠壶腹(球部)溃疡患者原疼痛节律消失,变为持续上腹痛,伴频繁呕吐隔夜酵酸性食物。推断患者出现的并发症是

- A.溃疡出血
- B.溃疡穿孔
- C.多发性溃疡
- D.溃疡癌变
- E.幽门梗阻

15.患者男,50岁。胃溃疡病史20余年,近1个月出现腹部疼痛不似以前规律,无恶心、呕吐、体重下降现象。入院检查大便隐血实验阳性,考虑胃溃疡伴消化道出血。下列生活指导正确的是(2016)

- A.禁食
- B.多饮肉汤
- C.高蛋白高纤维饮食
- D.温凉、清淡无刺激饮食
- E.加强体育锻炼

16.患者男,40岁。因胃溃疡穿孔行“毕I式胃大部切除术”。现术后4天,主诉腹部胀痛,恶心,停止排气排便。查体:全腹膨隆,未见肠型,中上腹轻度压痛及肌紧张,肠鸣音消失。最重要的处理措施是(2016)

- A.镇痛
- B.胃肠减压
- C.补液
- D.半卧位
- E.应用抗生素

17.患者女,36岁。以“突发腹痛3小时”急诊入院。患者自诉午饭后1小时出现症状,既往患胃溃疡10年。在没有明确诊断前,应采取的护理措施是(2017)

- A.解痉止痛
- B.流质饮食
- C.腹部热敷
- D.胃肠减压
- E.保留灌肠

18.溃疡性结肠炎的腹痛特点是

- A.疼痛一便意一便后缓解
- B.疼痛一便意一便后加重
- C.疼痛一进餐一餐后缓解
- D.疼痛一进餐一餐后加重
- E.疼痛一空腹一空腹缓解

19.患者,男性,38岁。因腹泻、腹痛2年,诊断为“溃疡性结肠炎”,本次急性加重5天入院。患者大便检查粪便的形态是

- A.米泔水样便
- B.黑便
- C.羊屎便
- D.白陶土样便
- E.黏液脓血便

20.患者,女,26岁。半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排粘液脓便,疑诊溃疡性结肠炎,拟行肠镜检查,门诊护士告知患者应在行肠镜检查的(2015)

- A.前4小时可进食
- B.前1天晚餐后禁食
- C.前2天停用铁剂
- D.前2天清洁灌肠
- E.前3天停用阿司匹林类药物

21.关于轮状病毒肠炎的腹泻特点,不包括

- A.多发生在秋、冬季
- B.可伴上呼吸道感染症状
- C.常伴腹痛、里急后重
- D.有轻度的全身感染中毒症状
- E.大便无腥臭味

22.下列腹泻的患儿,可选用口服补液盐治疗的是

- A.剧烈呕吐,且持续时间长者
- B.新生儿腹泻者
- C.轻、中度脱水者
- D.重度脱水者
- E.休克患儿

23.肠梗阻患者最重要的非手术措施是

- A.禁食、胃肠减压
- B.纠正水电解质失衡
- C.加强营养
- D.腹部按摩
- E.阿托品解痉

24.患者，女性，40岁，因肠梗阻入院。采用非手术治疗期间，护士发现腹部出现固定性压痛及腹膜刺激征，提示肠梗阻的性质演变为

- A.血运性
- B.机械性
- C.粘连性
- D.绞窄性
- E.单纯性

25.急性阑尾炎患者最典型的症状是(2014)

- A.转移性脐周疼痛
- B.转移性右下腹痛
- C.固定的脐周疼痛
- D.固定的右下腹痛
- E.腹痛位置无规律

26.阑尾周围脓肿消退后，行阑尾切除术的最佳时间是

- A.1周后手术切除
- B.3个月后手术切除
- C.2个月后手术切除
- D.3周后手术切除
- E.4年后手术切除

27.患者，女性，36岁。阑尾炎切除术后3天肠蠕动仍未恢复，为减轻腹胀，最简单、有效的措施是

- A.鼓励下床活动
- B.胃肠减压
- C.腹部热敷
- D.肛管排气
- E.腹部环形按摩

28.在腹外疝发病的诸多因素中，最重要的因素是

- A.妊娠
- B.举重
- C.慢性腹水
- D.慢性咳嗽
- E.腹壁强度降低

29.腹外疝内容物最多见的是

- A.小肠
- B.大网膜
- C.回肠

- D.结肠
- E.膀胱

30.患者男,65岁,发现腹股沟内侧包块3年余,3年前腹股沟包块突然增大变硬,不能还纳,伴剧烈疼痛,8小时前疼痛有所缓解,但出现发热,患者最可能出现了(2019)

- A.易复性疝
- B.难复性疝
- C.嵌顿性疝
- D.绞窄性疝
- E.急性阑尾炎

31.患者,男性,67岁,腹外疝。患者的特点是:站立时,疝内容物可突出并下降至阴囊,平卧后回纳疝块并压迫内环,嘱患者咳嗽疝块不再出现。患者的情况应考虑为

- A.脐疝
- B.白线疝
- C.切口疝
- D.腹股沟斜疝
- E.腹股沟直疝

32.绞窄性疝的处理原则为

- A.紧急手术
- B.手法复位
- C.补液
- D.胃肠减压
- E.解痉镇痛

(33~35题共用题干)(2015)

患者,男,51岁。反复出现排便后肛门疼痛,时有瘙痒4年余。站立或行走过程时肛门有肿胀感。昨日突发便后肛门剧烈疼痛,咳嗽时疼痛加剧。查体见肛门处有一紫红色肿块,有触痛感,直径约2cm。

33.最可能的诊断是

- A.直肠息肉脱出
- B.血栓性外痔
- C.肛管周围脓肿
- D.内痔并发感染
- E.肛裂

34.假如患者进行手术治疗,术后正确的护理措施是

- A.术后48小时内控制排便
- B.术后当天下床活动
- C.术后当天可进普食
- D.术后尽量减少或不使用镇痛剂
- E.术后每天用1:5000的高锰酸钾溶液坐浴

35.患者术后不会出现的情况是

- A.伤口出血
- B.尿潴留
- C.肛门疼痛

- D.伤口渗血
- E.肠粘连

36.患者男,25岁。一周前肛门周围持续性跳痛,皮肤红肿,并有局部压痛及波动感,判断为肛门周围脓肿。行手术治疗,并应用抗生素。选择抗生素的方法正确的是(2016)

- A.对革兰阳性菌有效的抗生素
- B.对厌氧菌有效的抗生素
- C.对金黄色葡萄球菌有效的抗生素
- D.对革兰阴性菌和厌氧菌有效的抗生素,宜联合用药
- E.对绿脓杆菌有效的抗生素

37.患者,男性,36岁,3天前感肛门内胀痛,今日出现畏寒,排尿困难,来医院检查。医生行直肠指检见肛管一侧有触痛性隆起,具有波动感。应考虑该患者所患疾病为

- A.混合痔
- B.肛瘘
- C.肛周感染
- D.直肠脱垂
- E.直肠癌

38.肛瘘最常继发于

- A.内痔
- B.肛裂
- C.直肠肿瘤
- D.直肠肛管周围脓肿
- E.直肠息肉

39.护士对肛管术后患者实施护理措施,其中能促进炎症吸收,缓解肛门括约肌痉挛的护理措施的是

- A.多吃蔬菜水果
- B.定时排便
- C.温水肛门坐浴
- D.保持局部清洁
- E.避免久坐

40.肝硬化患者肝功能减退的临床表现除外

- A.贫血
- B.脾大
- C.肝掌
- D.恶心、呕吐
- E.蜘蛛痣

41.门脉高压的三大表现(2017)

- A.吐血、黑便、脾大
- B.腹水、腹胀、脾大
- C.恶心、呕吐、腹胀
- D.脾大、腹水、侧支循环的建立和开放

E.发热、寒战、休克

42.肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是(2015)

- A.电解质紊乱
- B.肝性脑病
- C.原发性肝癌
- D.肝肾综合征
- E.上消化道出血

43.肝硬化腹水，给予螺内酯服用，护士应着重观察的是（2019）

- A.高钾血症
- B.心率
- C.脉搏
- D.凝血功能障碍
- E.低钾血症

44.评估肝硬化患者有无腹水的最佳方法是(2016)

- A.问诊
- B.叩诊
- C.听诊
- D.触诊
- E.视诊

(45~47 题共用题干) (2016)

患者男,50 岁。肝硬化 5 年。中午进食后突然呕血,色暗红、量约 350 mL,急诊入院。查体:神志清。T 37.5 °C,P 120 次/分,BP 190/60 mmHg。患者情绪高度紧张,诉说有濒死感。经抢救,患者病情平稳后行门体分流术。

45.入院时,患者主要的心理问题是

- A.抑郁
- B.恐惧
- C.焦虑
- D.淡漠
- E.悲哀

46.患者入院后采取的处理措施中不正确的是

- A.输液、输血
- B.应用保肝药物
- C.静脉止血药物的应用
- D.三腔二囊管压迫止血
- E.应用肥皂水灌肠

47.分流术后 24 小时内应指导患者采取的卧位是

- A.半坐卧位
- B.俯卧位
- C.平卧位

- D.中凹位
- E.头低足高位

48.属于氨中毒引起肝性脑病的主要机制是(2015)

- A.氨导致蛋白质代谢障碍
- B.氨干扰脑的能量代谢
- C.氨取代正常神经递质
- D.氨引起神经传导异常
- E.氨使氨基酸代谢不平衡

49.肝性脑病不可使用的灌肠溶液(2019)

- A.肥皂水
- B.硫酸镁
- C.生理盐水
- D.稀醋酸
- E.生理盐水加食醋

50.肝硬化病饮食方面应选择(2017)

- A.高热量、高蛋白、高维生素
- B.低热量、低蛋白、高维生素
- C.高热量、禁止蛋白摄入
- D.低纤维、低脂、低蛋白
- E.高蛋白、低纤维、低盐

51.发生细菌性肝脓肿时,细菌侵入肝最主要的途径是

- A.肝动脉
- B.门静脉
- C.肝静脉
- D.胆道系统
- E.十二指肠

52.细菌性肝脓肿最常见的早期症状为(2017)

- A.寒战高热
- B.肝区疼痛
- C.黄疸
- D.食欲减退
- E.乏力

53.患者男,35岁。1天前进食油腻食物后出现上腹剧烈疼痛,查体: Murphy征(+)。其压痛点位于(2016)

- A.膈下
- B.右肋下
- C.右下腹
- D.左肋下
- E.脐周

54.急性化脓性胆管炎的典型症状是夏柯(Charcot)三联症,其包括

- A.腹痛、恶心、高热
- B.腹痛、腹胀、休克
- C.腹痛、寒战高热、休克
- D.腹痛、黄疸、休克
- E.腹痛、黄疸、寒战高热

55.患者,男性,41岁,右上腹疼痛2天。查体:体温40°C,皮肤、巩膜黄染;B超示胆总管结石。为警惕发生重症胆管炎,护士应重点观察的内容是

- A.体温、脉搏
- B.腹膜刺激征
- C.恶心、呕吐
- D.血压、神志
- E.呼吸节律变化

56.患儿,女,10岁。突发腹部钻顶样疼痛2小时来院。大汗淋漓,辗转不安,疼痛停止时又平息如常。查体:剑突偏右方有压痛,无腹肌紧张及反跳痛。为明确诊断,应采取的检查是(2014)

- A.腹部B超
- B.ERCP
- C.右上腹X线平片
- D.测血清淀粉酶
- E.十二指肠引流液检查

57.患儿,男,13岁,以“胆道蛔虫病”入院治疗,经解痉止痛后病情缓解,给予驱虫药哌嗪治疗,指导患儿正确服用驱虫药的时间为(2019)

- A.清晨空腹或晚上临睡前
- B.进餐时服用
- C.餐前半小时
- D.餐后1小时
- E.腹痛时

58.急性胰腺炎的首发症状和主要表现(2017)

- A.腹痛
- B.恶心
- C.休克
- D.发热
- E.水、电解质及酸碱平衡紊乱

59.患者男,28岁。酗酒后突发剧烈上腹绞痛10h伴呕吐、冷汗、面色苍白入院。

查体:T 39.1°C,P 110次/分,BP 83/60 mmHg。腹上区压痛及反跳痛阳性、腹肌紧张,Grey-Turner征(+)。实验室检查:血清淀粉酶升高,血钙降低。最可能的诊断是(2016)

- A.急性水肿型胰腺炎
- B.出血坏死型胰腺炎
- C.急性胃穿孔
- D.胃溃疡
- E.胆石症

60.为缓解疼痛,急性胰腺炎患者可采取的体位是(2014)

- A.仰卧位
- B.俯卧位
- C.弯腰屈膝侧卧位
- D.半坐卧位
- E.仰卧屈膝位

61.患者,女,45岁。因餐后腹痛住院,拟诊为急性水肿性胰腺炎行保守治疗。护士告知患者行胃肠减压的主要目的是(2014)

- A.减轻腹胀
- B.防止恶心、呕吐
- C.减少胰液分泌
- D.预防感染
- E.防止胰液逆流

62.患者女,41岁。因“急性胰腺炎”收治入院。患者主诉剧烈腹痛,宜选用的药物是(2017)

- A.地西洋
- B.苯巴比妥
- C.吗啡
- D.阿司匹林
- E.哌替啶

63.上消化道出血临床最常见的病因是

- A.胃癌
- B.反流性食管炎
- C.消化性溃疡
- D.胃黏膜脱垂
- E.食管静脉曲张破裂

64.护士对于上消化道大出血伴休克的患者施行的首要护理措施是

- A.稳定患者情绪
- B.去枕平卧位
- C.建立静脉通路
- D.准备三腔二囊管
- E.准备手术

65.患者,女性,45岁。肝硬化病史8年,1小时前突然呕血约650ml,昏倒,急送医院,体检:血压70/50mmHg,脉搏120次/分,此时最有效的止血措施是

- A.应用冷盐水冲洗
- B.立即补充血容量
- C.三腔两囊管压迫止血
- D.服用血管加压素
- E.禁食

66.粪便隐血试验呈阳性时,上消化道出血量至少为

- A.5ml
- B.10ml
- C.20ml

D.30ml

E.50ml

67.患者消化道手术后，禁食 3 天，给予静脉输注 5%的葡萄糖液，待患者肠蠕动恢复再逐渐给予普通饮食，提示患者肠蠕动恢复的有效指征是(2018)

A.腹胀减轻

B.肛门排气

C.患者有饥饿感

D.患者有便意

E.胃管的引流量较前减少

68.患者男，38 岁。因急腹症手术治疗，术中见腹腔内少量淡黄色腹水，有粪臭味，最有可能的致病菌为(2017)

A.金黄色葡萄球菌

B.大肠杆菌

C.变形杆菌

D.绿脓杆菌

E.溶血性链球菌