

- 1.收集用药清单，整理医嘱，发现不适当用药并建议调整治疗方案的过程称为(C)
- A.处方审核
 - B.药物重整
 - C.药物重整
 - D.药物等效性评价
 - E.药品综合评价育
- 2.患者多年前曾用过心得安，现到药店购买此药，药师应提供的药品是(A)
- A.普萘洛尔
 - B.硝苯地平
 - C.硝酸异山梨酯
 - D.维拉帕米
 - E.美西律
- 3.要求“冷处”贮存的药品，贮存的温度应该是(C)
- A.10° C~ 30C
 - B.不超过 20° C
 - C.2° C~10° C
 - D.0° C
 - E.-10° C
- 4.规格为 25mg 的片剂，处方上用法为 25 mg tid,药师粘贴用法标签时正确的写法是(B)
- A.每日 3 次，每次 0.5 片
 - B.每日 3 次，每次 1 片
 - C.每日 2 次，每次 1 片
 - D.每日 2 次，每次 2 片
 - E.每日 1 次,每次 1 片
- 5.药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中，会发生相互影响,不能同时服药”，但没有明示服药间隔时间，通常建议的间隔时间是(C)
- A.0.5 小时
 - B.1 小时
 - C.2 小时
 - D.3 小时
 - E.4 小时
- 6.根据时辰规律给药有助于提高疗效、减少不良反应。下列药物中宜在清晨给药的是(A)
- A.氟西汀
 - B.辛伐他汀
 - C.氯苯那敏
 - D.比沙可啶
 - E.艾司唑仑教育
- 7.服用时需限制饮水的药物是(A)
- A.止咳糖浆
 - B.二羟丙茶碱
 - C.熊去氧胆酸教育，
 - D.利托那韦
 - E.阿仑膦酸钠
- 8.患者，女,52 岁,诊断为缺铁性贫血，医师给予硫酸亚铁片 0.3gtid 治疗，该药物的主要不良

反应是(C)

- A.心动过速
- B.头晕
- C.胃肠道不适教食
- D.肌肉酸痛
- E.尿频尿急

9.患者,男,66岁,2型糖尿病,长期口服二甲双胍,格列美脲,近日查空腹血糖 12.3mmol/L 糖化血红蛋白 9.0%,主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”,关于该患者药物治疗方案的说法,正确的是 B

- A.门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射
- B.因采用一日多次胰岛素治疗,格列美脲应停用
- C.患者为 2 型糖尿病,加用胰岛素一日 4 次方案不适宜润德软”
- D.甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用
- E.因采用一日多次胰岛素治疗,二甲双胍应停用

10.关于哺乳期妇女用药安全的说法,正确的是(A)

- A.口服避孕药可分泌至乳汁中,降低乳汁中吡哆醇含量,哺乳期应禁用
- B.依那普利可分泌至乳汁中,因含巯基可引起乳儿骨髓抑制,哺乳期应避免使用
- C.头孢呋辛易分泌至乳汁中哺乳期不宜使用
- D.阿奇霉素很少分泌至乳汁中,哺乳期可以使用
- E.青霉素 G 极易分泌至乳汁中,哺乳期不宜使用

11.

12.患者因关节疼痛就诊,诊断为骨性关节炎,有磺胺类药物过敏史,该患者禁用的止痛药是 (D)

- A.萘普生
- B.布洛芬
- C.对乙酰氨基酚
- D.塞来昔布
- E.美洛昔康

13.治疗肠易激综合征(腹泻型)的药物中,应避免睡前服用的是(A)

- A.匹维溴铵
- B.曲美布汀
- C.洛哌丁胺
- D.复方地芬诺酯
- E.蒙脱石散

14.在巨幼细胞贫血的治疗中,为避免加重神经系统损害,应与叶酸联合应用的药(B)

- A.维生素 B1
- B.维生素 B12
- C.维生素 B
- D.维生素 K1
- E.维生素 C

15.患者,男,36岁,肥胖,2型糖尿病,肝肾功能正常,在饮食和运动管理基础上长期服用二甲双胍 2g/d,血糖控制不理想。为控制血糖,且不增加患者体重可加用的降糖药物是(B)

- A.格列喹酮
- B.瑞格列奈

- C.利拉鲁肽
- D.胰岛素
- E.罗格列酮

16.关于胃食管反流病治疗方案的说法,错误的是(C)

- A.存在夜间酸突破时,可以加用法莫替丁 20mgbid
- B.一种 PPI 无效时,可以换用另一种 PPI
- C.标准剂量 PP 无效时,可改为 2 倍标准剂量
- D.PPI 单用疗效不佳时,可以加用莫沙必利
- E.存在胆汁反流时,可以加用铝碳酸镁咀嚼片入

17.患者,男,23岁,因近日脚趾间瘙痒、有明显脱皮就诊,诊断为足癣。关于该患者用药指导和健康教育的说法,错误的是(D)

- A.应注意保持鞋袜、足部清洁干燥
- B.不与他人共用生活物品,如指甲刀、拖鞋等,以免交叉传染
- C.可使用咪康唑、酮康唑或特比萘芬等局部抗真菌药治疗
- D.使用局部抗真菌药,症状消失 1~2 天后即可停药
- E.在局部用药期间,用温水清洗患处皮肤,尽量少用或不用肥皂

18.关于前列腺增生症药物治疗的说法,错误的是(B)

- A.a 受体阻断剂可快速起效
- B.M 受体阻断剂可减少残余尿量
- C.5a 还,原酶抑制剂可缩小前列腺体积
- D.5a 还原酶抑制剂可使血清前列腺特异性抗原(PSA)水平降低约 50%
- E.5a 还原酶抑制剂可长期使用润德教育

题目 19:

19.患者,男,53岁,近日体检发现高血压,血压 170/95mmHg,化验显示:肝肾功能正常,血尿酸 535mo/L。该患者不宜选用的降压药是(D)

- A.氨氯地平
- B.依那普利
- C.特拉唑嗪
- D.氢氯噻嗪德
- E.氯沙坦钾

20.关于 B 受体阻断剂用于冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的说法,错误的是(D)

- A.可减少心绞痛发作,提高运动耐量
- B.应作为稳定型心绞痛的初始治疗药物
- C.使用剂量应个体化
- D.是变异型心绞痛的首选治疗药物
- E.支气管哮喘急性发作期禁用

21.在妊娠期不同阶段,药物对胎儿的影响不同。妊娠期用药时极少观察到致畸作用的时间段是(C)

- A.妊娠 4~8 周
- B.妊娠 8~12 周
- C.受精后 2 周内
- D.妊娠 13~20 周
- E.妊娠 21-28 周

22. 下列治疗心力衰竭的药物中，不能延缓心肌重构的是(B)
- A. 依那普利
 - B. 呋塞米
 - C. 坎地沙坦
 - D. 美托洛尔
 - E. 螺内酯
23. 患者，女，14岁，诊断为原发性痛经。该患者宜优先采用的治疗方案是
- A. 服用非甾体抗炎药
 - B. 性激素周期疗法
 - C. 扩张宫颈，以利经血流出
 - D. 雄激素周期疗法
 - E. 服用弱阿片类药物
24. 患者，女，37岁，体检发现 1b5egL，拟静脉补铁，可选用的药物是
- A. 硫酸亚铁
 - B. 多糖铁复合物
 - C. 蔗糖铁
 - D. 葡萄糖酸亚铁
 - E. 琥珀酸亚铁
25. 关于药物在肝功能不全患者药动学和药效学变化的说法，错误的是
- A. 主要在肝内代谢清除的药物，生物利用度提高
 - B. 需要肝脏生物转化的前体药物，药效降低
 - C. 蛋白结合率高的药物，血中游离药物浓度增加
 - D. 首过消除明显的药物，药理作用维持时间缩短
 - E. 血胆汁酸和胆红素升高，血浆蛋白与药物结合的能力下降
26. 患者，男，45岁。1月前因突发右侧肢体无力、言语障碍就诊，诊断为缺血性脑卒中，现服用阿托伐他汀钙片，每晚1次，每次20mg 该患者 LDLC 的控制目标值是
- A. <1.8 mmol/L 准，
 - B. <4, 4 mmol/l
 - C. <34 mmol/L
 - D. <2.6 mmol/l 有
 - E. <1.0 mmol/L
27. 患者，男，41岁，BM302kg/m²，因上腹胀1年就诊，常年饮酒(酒精量10d)，腹部B超显示:脂肪肝。生化检查:ALT100U/L，AST210U/L，γGGT130U/L，TG3.3mmol/L，血糖正常，肝炎病毒相关检查(-)，关于该患者疾病管理的说法，错误的是
- A. 定期复查肝功能和腹部B超
 - B. 高蛋白、低脂饮食
 - C. 减轻体重
 - D. 使用依折麦布调节血脂
 - E. 戒酒
37. 在房颤治疗中，关于控制心室率常用药物用法用量的说法，错误的是
- A. 比索洛尔片,每次5mg,每日2次,口服
 - B. 酒石酸美托洛尔片,每次25mg,每日2次,口服
 - C. 琥珀酸美托洛尔缓释片,每次47.5mg,每日1次,口服

D.卡维地洛片,每次 25mg 每日 2 次,口服,

E.胺碘酮胶囊,每次 100mg,每日 1 次,口服

38.患者,女,26 岁,因上腹痛就诊,胃镜显示胃溃疡,13C 呼气试验结果为阳性青霉素皮试阴性,医师开具阿莫西林、克拉霉素、奥美拉唑和枸橼酸铋钾 4 种药物,关于两种抗菌药物服用时间的说法,正确的是

A.二者均饭后服用,提高胃内药物浓度

B.二者均饭前服用,避免食物影响吸收

C.二者均饭前服用,减少胃酸对药物破坏

D.阿莫西林饭前服用吸收好,克拉霉素饭后服用对胃刺激小

E.二者均饭后服用,减轻对胃部刺激

39.患者,男,47 岁,肾移植术后,抗排异治疗,不应选用的药物是

A.环孢素

B.他克莫司

C.吗替麦考酚酯

D.伏立康唑

E.糖皮质激素

40.关于单纯疱疹病毒(HSV)感染的说法,错误的是

A.对生殖器 HSV 感染的产妇,宜行剖宫产,以避免分娩时感染胎儿

B.使用安全套是降低生殖器 HV2 传播风险的有效手段

C.HSV 感染与癌症发病相关

D.HSV 可潜伏在人体多种器官内

E.可接种 HSV 疫苗进行预防有

二、配伍选择题

A.阿奇霉素

B.氨苄西林

C.氟康唑

D.莫西沙星

E.利奈唑胺

41.属于时间依赖性且半衰期很短的抗菌药物是

42.属于浓度依赖性的抗菌药物是

43.

A.硫酸亚铁

B.维生素 C

C.碳酸氢钠

D.维生素 B

E.叶酸

46.可使大便颜色变黑的药物是

47.同时服用可减少铁剂吸收的药物是

48.可与口服铁剂合用以促进铁吸收的药物是

A.单孕激素补充方案

B.单雌激素补充方案

C.雌、孕激素连续联合方案

D.雌、孕激素序贯方案

E.阴道局部应用雌激素

- 49.适用于已切除子宫的绝经期妇女的治疗方案是
- 50.适用于有完整子宫、不希望有月经样出血的绝经期妇女的治疗方案是
- 51.适用于绝经过渡期早期，调整卵巢功能衰退过程中出现的月经问题的治疗方案是
- A.多沙唑嗪
- B.赖诺普利
- C.羟考酮
- D.辛伐他汀
- E.氨氯地平
- 52.易引起直立性低血压的药物是
- 53.可能引起足踝部水肿的药物是
- 54.易引起便秘的药物是
- A. β 受体阻断剂
- B.噻嗪类利尿剂
- C. α 受体阻断剂章.福 教育
- D.二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- E.血管紧张素转换酶抑制剂
- 55.高血压合并糖尿病患者，若无禁忌证，首选的降压药物是
- 56.高血压合并前列腺增生患者，若血压控制欠佳，建议加用的药物是
- 57.高血压合并糖尿病患者，为避免掩盖低血糖症状，应慎用的药物是
- A.绿叶蔬菜
- B.咖啡
- C.葡萄柚汁
- D.奶制品
- E.深海鱼油
- 58.服用辛伐他汀期间不宜食用的是新省
- 59.长期服用糖皮质激素的患者宜多食用的是
- A.劳拉西泮
- B.美金刚
- C.多塞平
- D.多奈哌齐
- E.左乙拉西坦
- 60.适用于急性期焦虑患者短期服用的药物是
- 61.育龄期女性癫痫病患者可酌情使用的药物是有
- 62.可改善认知功能但有加重消化性溃疡风险的药物是
- [63~65]
- A.纳洛酮
- B.氟马西尼
- C.青霉胺
- D.乙酰半胱氨酸
- E.亚甲蓝
- 63.用于铜、汞、铅中毒解救，治疗肝豆状核变性病的药物是
- 64.用于氰化物中毒解救的药物是
- 65.用于苯二氮草类药物中毒解救的药物是
- [66~67]

- A.利奈唑胺
- B.莫西沙星
- C.阿奇霉素
- D.氟康唑
- E.氨苄西林

66.属于时间依赖性且半衰期很短的抗菌药物是

67.属于浓度依赖性的抗菌药物是

[91~92]

(一)

患者，男，62岁，因骨性关节炎,药物治疗效果不佳，关节坏死，拟行人工节置换术。

91.适宜该患者预防性使用的抗菌药物是(B)

- A.头孢曲松
- B.头孢唑林
- C.头孢哌酮
- D.头孢他啶
- E.氨曲南

92.关于该患者手术时预防性抗菌药物给药时机的说法，正确的是(A)

- A.应在皮肤、黏膜切开前 0.5~1 小时内静脉滴注
- B.应在皮肤、黏膜切开前 1.5~30 分钟内静脉滴注
- C.应在皮肤、黏膜切开前 1.5~2 小时内静脉滴注
- D.应在皮肤、黏膜切开前 2.5~3 小时内静脉滴注
- E.应在皮肤、黏膜切开前 3~4 小时内静脉滴注

(二)

患者，女，32岁，已婚未孕。3个月前出现腹泻，多为稀糊状，间断为黏液及脓血便，每日8~12次，有里急后重感，结肠镜检查诊断溃疡性结肠炎(全结肠型)，医师处方美沙拉秦缓释片和美沙拉秦灌肠剂。

93.关于美沙拉秦治疗作用的说法，正确的是(B)

- A.美沙拉秦缓释片仅作用于近端结肠
- B.美沙拉秦主要通过在肠道内发挥局部作用而产生治疗作用
- C.美沙拉秦为柳氮磺吡啶的前体药物,水解后起效
- D.美沙拉秦灌肠剂仅能作用于直肠局部病变
- E.美沙拉秦通过结构中的磺胺吡啶所具有的抗菌活性产生治疗作用

94.关于该患者用药注意事项的说法，正确的是

- A.美沙拉秦缓释片不可随餐服用,必须空腹服用
- B.用药期间需常规补充叶酸
- C.美沙拉秦缓释片可掰开后服用，但不能咀嚼教育
- D.美沙拉秦灌肠剂应清晨给药
- E.无需监测肾功能,但需监测血常规