

走更远的路，才能看到更多的风景
爬更高的山，才能获得不同的视角



● 切取活检的标本切取后应

- A.立即放入 10% 甲醛固定液中
- B.立即放入 3% 戊二醛固定液中
- C.立即放入 4% 甲醛固定液中
- D.立即放入 0.9% 生理盐水中
- E.不作任何处理，尽快送病理科

【答案】C

● 拔除下颌第一磨牙需要麻醉的神经是

- A.下颌神经、舌神经及颊长神经
- B. 颊神经及舌神经
- C.下牙槽神经、舌神经及颊支
- D.下牙槽神经、舌神经及颊长神经
- E. 下牙槽神经

【答案】D

● 关于绷带包扎的注意事项，哪一项是不正确的

- A.包扎颌下区及颈部时，应注意保持呼吸道畅通
- B.腮腺区包扎不应有压力，以免发生面神经损伤

- C.所施压力适度，防止组织受压发生坏死
- D.脓肿切开引流后，首先应加压包扎
- E.骨折复位后，包扎时应注意防止错位

【答案】B

● 在下列间隙感染中，哪—个最常引起颌骨边缘性骨髓炎

- A.颞间隙
- B.咬肌间隙
- C.下颌下间隙
- D.颈下间隙
- E.眶下间隙

【答案】B

● 咬肌间隙感染最常见的病灶牙是

- A.下颌尖牙
- B.下颌前磨牙
- C.下颌第二磨牙
- D.下颌第三磨牙
- E.下颌中切牙

【答案】D

● 化脓性颌骨骨髓炎急性期的X线片表现是

- A.骨小梁有斑点状吸收
- B.有骨膜反应

- C.有死骨形成
- D.破坏区周围有骨质增生
- E.颌骨未见明显改变

【答案】E

● 大出血后出现休克症状，表明至少已丢失全身总血量的

- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.25%
- E.30%

【答案】C

● 舌损伤缝合时下列哪项不符合要求

- A.尽量保持舌的长度
- B.采用小针细线缝合
- C.距创缘稍远进针
- D.最好加用褥式缝合
- E.进针要深些

【答案】B

● 下列颧骨颧弓骨折中，复位后不需固定的是

- A.颧骨体骨折向后下内移位，不伴有转位
- B.向内转位颧骨体骨折

- C.向外转位颧骨体骨折
- D.复杂性骨折
- E.颧骨、上颌骨骨折

【答案】C

● 颊部外伤后，出现双侧后牙早接触，前牙开 δ ，侧运动受限时，可能的诊断是

- A.颈部骨折
- B.单侧髁状突骨折
- C.双侧髁状突骨折
- D.颏孔区骨折
- E.下颌角部骨折

【答案】C

● 单侧下颌颏孔部垂直骨折，后段骨折片常向前上方移位并稍偏健侧是由于

- A.前段骨折片所附升颌肌群牵引
- B.后段骨折片所附升颌肌群牵引
- C.前段骨折片所附降颌肌群牵引
- D.后段骨折片所附降颌肌群牵引
- E.后段骨折片所附翼外肌牵引

【答案】B

● 为了明确诊断，最适宜的检查方法是

- A.脱落细胞涂片镜检
- B.切取活检
- C.吸取活检
- D.切除活检
- E.细针穿刺细胞学活检

【答案】B

● 其 TNM 分类是

- A.T0N1M0
- B.T2N1M0
- C.T2N2M0
- D.T4N2M0
- E.T4N3M0

【答案】B

● 根据其 TNM 分期，可判断患者肿瘤临床分期是

- A. II 期
- B. III 期
- C. IVA 期
- D. IVB 期
- E. IVC 期

【答案】B

● 化疗药物最严重的不良反应是

- A.恶心呕吐
- B.厌食
- C.皮肤瘙痒
- D.骨髓抑制
- E.脱发

【答案】D

● 成釉细胞瘤含有

- A.透明、淡黄色水样液体
- B.血性液体
- C.黄褐色液体
- D.草黄色液体
- E.黄白色蛋白样液体

【答案】C

● 关于腮腺多形性腺瘤手术的叙述中，错误的是

- A.单纯肿瘤摘除术
- B.将肿瘤连同周围腮腺组织一并切除术
- C.肿瘤在浅叶时，将肿瘤和腮腺浅叶一并切除术
- D.肿瘤在深叶时，将肿瘤连同全腮腺切除术
- E.各种术式均要保留面神经

【答案】A

● 单纯涎石摘除术适用于

- A.涎石发生在导管内
- B.涎石发生在导管与腺体交界处
- C.涎石发生在腺体内
- D.涎石发生在导管内，腺体尚未纤维化者
- E.涎石发生在导管内，腺体已纤维化者

【答案】D

- 患者以左侧颞下颌关节开口末、闭口初期弹响就诊，关节检查发现张口度达 5.5cm，开口型偏向右侧，X 线检查开口位时髁突超过关节结节，关节造影检查未见关节囊、关节盘的改变，你认为此患者最有可能的诊断是

- A.右侧翼外肌亢进
- B.左侧可复性关节盘前移位
- C.左侧关节囊扩张伴关节盘附着松弛
- D.左侧翼外肌亢进
- E.右侧关节囊扩张伴关节盘附着松弛

【答案】D

- 颞下颌关节内强直最常见的原因是

- A.颞下颌关节紊乱病
- B.关节损伤
- C.类风湿关节炎
- D.面部烧伤
- E.颞下窝肿瘤放射治疗后

【答案】 B

● 下列治疗颜面部疖痈的方法不正确的是

- A.一般采用保守治疗
- B.痈可采用高渗盐水纱布湿敷
- C.疖和痈可用硝酸银烧灼促进愈合
- D.全身支持治疗
- E.唇痈可保守性切开，但不可分离脓腔

【答案】 C

● 属于非特异性感染的病原菌有

- A.结核菌
- B.梅毒螺旋体
- C.放线菌
- D.大肠杆菌
- E.破伤风杆菌

【答案】 D

● 哪个间隙感染一般不发生张口受限

- A.颞下间隙
- B.咬肌间隙
- C.翼下颌间隙
- D.眶下间隙
- E.颞间隙

【答案】 D

● 下列下颌骨骨折的好发部位中，发生比率最低的是

- A.下颌体
- B.正中联合
- C.颏孔区
- D.下颌角
- E.髁突颈部

【答案】 A

● 单侧颏孔部垂直下颌骨骨折，前段骨折片向下，是由于

- A.患侧降颌肌群的牵引
- B.健侧降颌肌群的牵引
- C.双侧降颌肌群的牵引
- D.双侧升颌肌群的牵引
- E.健侧升颌肌群的牵引

【答案】 C

● 要判断口腔癌晚期有无全身转移，最佳的检查手段是

- A.全身 CT
- B.MRI
- C. ECT
- D. DSA
- E. B 超

【答案】 C

● 以下哪种囊肿不属于发育性囊肿

- A. 鳃裂囊肿
- B. 根尖牙囊肿
- C. 鼻唇囊肿
- D. 球上颌囊肿
- E. 甲状腺管囊肿

【答案】 B

● 被称为“滤泡囊肿”的是

- A. 始基囊肿
- B. 含牙囊肿
- C. 角化囊肿
- D. 根尖囊肿
- E. 鳃裂囊肿

【答案】 B

● 下列不属于智齿冠周炎症状的是

- A. 张口受限
- B. 磨牙后区肿胀
- C. 局部自发性跳动，伴放射痛
- D. 下唇麻木感
- E. 全身不适，发热等

【答案】 D

● 以下哪种迹象可能与多形性腺瘤恶变无关

- A.肿瘤为多发
- B.肿瘤在近期生长加速
- C.肿瘤出现疼痛
- D.瘤体不活动
- E.出现面瘫症状

【答案】 A

● 急性化脓性腮腺炎的主要致病菌是

- A.链球菌
- B.大肠杆菌
- C.肺炎双球菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.白色念珠菌

【答案】 D

● 牙槽突骨折固定时牙弓夹板和正畸托槽的放置均应跨过骨折线至少（ ）个牙位

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

E.5

【答案】C

- A. 主要症状是开口初有弹响，以后可发展为开口末期弹响
- B. 有弹口向病史，进而弹响消失，开口受限，开口时下颌偏向患侧
- C. 开口末、闭口初单声清脆音弹响，开口度过大呈半脱位，开口型偏患侧
- D. 开闭口出现多声破碎音，开口型歪曲，关节区压痛
- E. 开口运动中有连续摩擦音或捻发音或似揉玻璃低音

- 骨关节病

【答案】E

- 不可复性关节盘前移位

【答案】B

- 关节盘穿孔破裂

【答案】D

- 可复性关节盘前移位

【答案】A

- 口腔种植学的指导理论是

A. 骨性结合理论

B. 骨结合理论

C. 骨牵张理论

D. 微创理论

E.骨粘连理论

【答案】B

● 领面部无菌创口一般的处理原则是

- A.每日更换敷料
- B.创口湿敷
- C.创口冲洗
- D.创口严密缝合，早期暴露
- E.大剂量应用抗生素

【答案】D

● 成年人阿替卡因一次最大用量为

- A.5.0mg/kg
- B. 6.0mg/kg
- C. 7.0mg/kg
- D. 4.4mg/kg
- E. 8.0mg/kg

【答案】C

● Schirmer 试验滤纸夹持时间是

- A.1 分钟
- B.2 分钟
- C.3 分钟
- D.4 分钟

E.5分钟

【答案】E

● 传统骨折愈合过程中，骨痂形成时间一般在骨折后

- A.1~6天
- B.7~14天
- C.15~20天
- D.21~28天
- E.29~35天

【答案】B

● 颌颌牵引常用于复位

- A.上颌骨骨折
- B.下颌骨颏孔区骨折
- C.颧骨骨折
- D.下颌骨骨折
- E.牙槽突骨折

【答案】D

● 拔牙钳钳喙与牙长轴平行是为了

- A.夹住患牙
- B.省力
- C.防止邻牙损伤
- D.避免牙龈损伤

E.利于使用扭转力

【答案】C

- 上颌骨骨折线自鼻额缝向两侧扩展至眶部至颧额缝，再沿上颌骨侧壁到达蝶骨翼突的骨折，属上颌骨

A.不对称骨折

B.LeFort I 型骨折

C.LeFort II 型骨折

D.Lefort III 型骨折

E.纵形骨折

【答案】D

- 制备种植窝时骨床的温度不应超过（ ）度.

A.36

B.42

C.47

D.52

E.55

【答案】C

- 关于贝尔面瘫的描述，哪项是正确的

A.属于核上性面瘫

B.多为面神经的急性非化脓性炎症引起

C.大多数患者预后较差

- D.常发病缓慢
- E.常常双侧发生

【答案】 B

● 以下关于三叉神经痛的叙述，哪项是错误的

- A.三叉神经痛分为原发性和继发性两种
- B.疼痛可自发,也可由刺激“扳机点”引起
- C.原发性三叉神经痛患者无论病程长短，神经系统检查极少有阳性体征
- D.角膜反射的改变常提示为原发性三叉神经痛
- E.目前治疗三叉神经痛的首选药物是痛痉宁

【答案】 D

● 牙拔除术时，当患者患有下列哪类疾病时，局麻药中应慎用肾上腺素

- A.肿瘤
- B.血友病
- C.精神病
- D.甲状腺机能亢进
- E.肺结核

【答案】 D

● 下列关于局部麻醉药物的描述哪个是正确的

- A.心律失常患者常用的局麻药为酯类
- B.普鲁卡因的效能强度高于酰胺类局麻药物

- C. 丁卡因常用于浸润麻醉
- D. 普鲁卡因可用于表面麻醉
- E. 甲哌卡因 3 岁以下儿童禁用

【答案】 E

● 患儿，8个月，右上红唇白唇裂开，鼻底正常，左侧红唇至鼻底完全裂开，该患者诊断分类为

- A. 不完全性双侧唇裂
- B. 完全性双侧唇裂
- C. 混合性双侧唇裂
- D. 单纯性唇裂
- E. II °唇裂

【答案】 C

● 患儿，女性，11个月，系先天性左侧完全性唇裂，拟行唇裂修复术，其麻醉方法最好采用

- A. 双侧眶下神经阻滞麻醉
- B. 左侧眶下神经阻滞麻醉
- C. 气管内插管全身麻醉
- D. 氯胺酮分离麻醉+双侧眶下神经阻滞麻醉
- E. 上唇局部浸润麻醉

【答案】 C