

中西医模拟试卷

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学的基本特点是
 - A. 整体观念和阴阳五行
 - B. 四诊八纲和辨证论治
 - C. 同病异治和异病同治
 - D. 整体观念和辨证论治
 - E. 阴阳五行和五运六气
2. 采取同病异治方法的原因是
 - A. 疾病相同
 - B. 症状不同
 - C. 阶段相同
 - D. 证候不同
 - E. 体征不同
3. 下列选项属于阳的事物或现象是
 - A. 下降
 - B. 静止
 - C. 涩脉
 - D. 洪脉
 - E. 面色晦暗
4. “阴中求阳”的理论依据是
 - A. 阴阳相互转化
 - B. 阴阳互根互用
 - C. 阴阳相互消长
 - D. 阴阳对立制约
 - E. 阴阳动态平衡
5. 下列哪项是防治疾病的基本原则
 - A. 损其有余
 - B. 补其不足
 - C. 寒者热之
 - D. 热者寒之
 - E. 调整阴阳
6. 能够推动和调节脏腑气化的脏是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
7. “其华在爪”的脏是
 - A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

8. 下列哪一项不是脾胃的关系

A. 燥湿相济

B. 纳运相得

C. 升降相因

D. 升清降浊

E. 水火既济

9. 下列何种病人多见面黄虚浮

A. 阴黄

B. 脾虚湿蕴

C. 肝脾不调

D. 阳黄

E. 脾胃气虚

10. 根据阴阳五行和脏象学说理论，五脏应五色，白色内应

A. 肾

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肝

11. 病人肢体软弱，行动不便属

A. 瘫痪

B. 痹病

C. 痿病

D. 痲病

E. 中风后遗症

12. 口腔肌膜灰白色小溃疡，周围红晕，局部灼痛者称为

A. 口疮

B. 鹅口疮

C. 口糜

D. 口报

E. 口喎

13. 牙齿燥如枯骨的临床意义是

A. 阳明热甚，津液大伤

B. 胃阴已伤

C. 肾阴枯竭，精不上荣

D. 肾虚，虚火上炎

E. 肝阳上亢

14. 咯痰白滑，量多易出者，属

A. 燥痰

B. 寒痰

C. 热痰

- D. 湿痰
E. 肺痈之痰
15. 小儿食指络脉达于命关的临床意义是
A. 正常表现
B. 邪气入经，邪深病重
C. 邪气入络，邪浅病轻
D. 邪入脏腑，病情严重
E. 病情凶险，预后不良
16. 邪热犯胃而致呕吐，呕吐物的特点是
A. 呕吐物清稀
B. 呕吐物酸臭
C. 伴食物残渣
D. 伴暗红色血
E. 呕吐黄绿苦水
17. 具有发散作用的药味是
A. 咸
B. 酸
C. 苦
D. 辛
E. 甘
18. 五味之中，具有泻火坚阴作用的味是
A. 甘味
B. 咸味
C. 辛味
D. 苦味
E. 酸味
19. 下列各项，不属妊娠绝对禁用的药物是
A. 麝香
B. 巴豆
C. 大戟
D. 半夏
E. 斑蝥
20. 治疗皮肤瘙痒、脓疱疮、疥癣、淋证涩痛，应选用的药物是
A. 黄柏
B. 黄连
C. 苦参
D. 紫草
E. 麻黄
21. 松子仁除润肠通便之功外，还具有的功效是
A. 利水消肿
B. 生津止渴
C. 润肺止咳
D. 养血安神
E. 益气健脾
22. 性微温而善于芳香化湿解暑的药物是
A. 香薷
B. 佩兰
C. 砂仁
D. 豆蔻

E. 藿香

23. 附子入汤剂先煎的目的是

A. 充分煎出有效成分

B. 减轻毒性

C. 增强功效

D. 产生新作用

E. 减轻刺激性

24. 下列具有降血脂作用，适用于高脂血症、高血压、冠心病的药物是

A. 山楂

B. 神曲

C. 麦芽

D. 稻芽

E. 莱菔子

25. 治疗出血，血瘀经闭，风湿痹痛，应选用的药物是

A. 茜草

B. 地榆

C. 槐花

D. 生地黄

E. 侧柏叶

26. 当归补血汤原方中，当归与黄芪的配伍用量比例是

A. 1:1

B. 1:2

C. 1:5

D. 2:1

E. 5:1

27. 主治暗瘕证的方剂是

A. 右归丸

B. 大补阴丸

C. 右归饮

D. 补中益气汤

E. 地黄饮子

28. 酸枣仁汤组成的药物中含有

A. 知母

B. 茯神

C. 远志

D. 柏子仁

E. 龙眼肉

29. 大定风珠所主证候的病因病机是

A. 阴血不足，风自内生

B. 邪热亢盛，热极动风

C. 肝阳偏亢，化风上旋

D. 真阴大亏，虚风内动

E. 痰浊上逆，引动肝风

30. 实脾散的功用是

A. 利水渗湿，清热养阴

- B. 益气祛风，健脾利水
 - C. 利水渗湿，温阳化气
 - D. 利湿消肿，理气健脾
 - E. 温阳健脾，行气利水
31. 清气化痰丸组成的药物中不含有
- A. 陈皮、光杏仁
 - B. 黄芩、炒枳实
 - C. 白果、胆南星
 - D. 茯苓、制半夏
 - E. 瓜蒌仁
32. 手足三阳经在四肢的分布规律是
- A. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
 - B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
 - C. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
 - D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
 - E. 少阳在前，阳明在中，太阳在后
33. 被称为“阳脉之海”的是
- A. 带脉
 - B. 督脉
 - C. 冲脉
 - D. 阳维脉
 - E. 阳跷脉
34. 以下腧穴中，胆的募穴是
- A. 胆俞
 - B. 阳陵泉
 - C. 章门
 - D. 期门
 - E. 日月
35. 根据俞募配穴法，治疗胃痛应选用
- A. 中脘、足三里
 - B. 太冲、三阴交
 - C. 中脘、胃俞
 - D. 章门、胃俞
 - E. 中脘、脾俞
36. 不属于尺泽穴主治病证的是
- A. 咯血、咽喉肿痛
 - B. 咳嗽、气喘
 - C. 急性腹痛、吐泻
 - D. 肘臂挛痛、小儿惊风
 - E. 齿痛、口眼喎斜
37. 足阳明胃经的起始穴是
- A. 厉兑
 - B. 承泣
 - C. 迎香

- D. 大敦
 - E. 内庭
38. 治疗失眠、神经衰弱宜选用的耳穴是
- A. 角窝上
 - B. 内分泌
 - C. 角窝中
 - D. 神门
 - E. 肾上腺
39. 下列各项中，不属于对症选穴的是
- A. 落枕取外劳宫
 - B. 目赤取耳尖
 - C. 发烧取大椎
 - D. 痛经取次髎
 - E. 肝阳上亢者取太冲
40. 表现为典型弛张热的疾病是
- A. 风湿热
 - B. 渗出性胸膜炎
 - C. 疟疾
 - D. 布鲁杆菌病
 - E. 肺炎球菌性肺炎
41. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是
- A. 颅内高压症
 - B. 小脑肿瘤
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 脑膜炎
 - E. 中暑
42. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是
- A. 急性化脓性胆管炎
 - B. 结缔组织病
 - C. 急性腹腔内出血
 - D. 肠梗阻
 - E. 结核性腹膜炎
43. 水肿多表现为局部性的是
- A. 心性水肿
 - B. 肝性水肿
 - C. 营养不良性水肿
 - D. 肾性水肿
 - E. 血管神经性水肿
44. 下列属于“既往史”内容的是
- A. 发病时间
 - B. 预防接种
 - C. 疫水接触史
 - D. 病因与诱因
 - E. 工业毒物接触史

45. 引起身体外露部分皮肤色素沉着增加的疾病是

- A. 库兴综合征
- B. 阿狄森病
- C. 糖尿病
- D. 帕金森病
- E. 黏液性水肿

46 容易闻及二尖瓣狭窄杂音的体位是

- A. 平卧位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- D. 坐位
- E. 立位

47. 主动脉瓣狭窄，可出现的体征是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨右缘第 2 肋间舒张期震颤

48. 可出现单侧上眼睑下垂的疾病是

- A. 动眼神经麻痹
- B. 面神经麻痹
- C. 重症肌无力
- D. 营养不良
- E. 先天性上眼睑下垂

49. 由于红细胞破坏过多所引起的贫血是

- A. 失血性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 巨幼细胞贫血

50. 引起嗜酸性粒细胞增多的原因是

- A. 伤寒
- B. 应激状态
- C. 库欣综合征
- D. 寄生虫病
- E. 应用皮质激素后

51. 急性病毒性肝炎时明显增高的酶是

- A. 肌酸激酶 (CK)
- B. 乳酸脱氢酶 (LDH)
- C. 碱性磷酸酶 (ALP)
- D. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)
- E. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)

52. 下列各项，不属急性心肌梗死检测指标的是

- A. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

- B. 碱性磷酸酶 (ALP)
 - C. 乳酸脱氢酶 (LDH)
 - D. 肌酸激酶 (CK)
 - E. 心肌肌钙蛋白 T (cTnT)
53. 心电图示心率 180 次/分, QRS 波时间为 0.10s, R-R 绝对整齐, 心电图诊断是
- A. 窦性心动过速
 - B. 阵发性室上性心动过速
 - C. 阵发性室性心动过速
 - D. 心房纤颤
 - E. 心室颤动
54. 慢性支气管炎的常见并发症是
- A. 肺气肿
 - B. 肺不张
 - C. 肺空洞
 - D. 胸膜炎
 - E. 肺钙化灶
55. 骨软骨瘤的好发部位是
- A. 长骨骨干
 - B. 长骨干骺端
 - C. 短骨干骺端
 - D. 长骨骨端
 - E. 扁骨
56. 药物的副作用是
- A. 与治疗目的无关的作用
 - B. 用药量过大或用药时间过久引起的反应
 - C. 用药后给病人带来的不舒适的反应
 - D. 停药后, 残存药物引起的反应
 - E. 在治疗剂量时产生的与治疗目的无关的作用
57. 毛果芸香碱滴眼后产生的作用是
- A. 扩瞳、降眼压, 调节痉挛
 - B. 扩瞳、升眼压, 调节麻痹
 - C. 缩瞳、升眼压, 调节痉挛
 - D. 缩瞳、降眼压, 调节痉挛
 - E. 缩瞳、升眼压, 调节麻痹
58. 具有中枢性抗胆碱作用的药物是
- A. 山莨菪碱
 - B. 后马托品
 - C. 阿托品
 - D. 东莨菪碱
 - E. 优卡托品
59. 关于酚妥拉明的药理作用, 错误的是
- A. 舒张血管
 - B. 拟组胺样作用
 - C. 拟胆碱作用

- D. 增加胃肠平滑肌张力
 - E. 抑制心脏
60. 左旋多巴的临床应用是
- A. 脑膜炎后遗症
 - B. 乙型肝炎
 - C. 失眠
 - D. 脑血栓
 - E. 肝昏迷
61. 不属于 H_1 受体阻滞药物的应用是
- A. 晕动病呕吐
 - B. 胃十二指肠溃疡
 - C. 皮肤瘙痒和水肿
 - D. 支气管哮喘
 - E. 过敏性鼻炎
62. 硝普钠的临床应用是
- A. 高血压急症
 - B. I 级高血压
 - C. II 级高血压
 - D. I、II 级高血压
 - E. II 级高血压伴肾功能不全
63. 下列原因导致的慢性心功能不全，强心苷疗效较好的是
- A. 高血压、心脏瓣膜病、先天性心脏病
 - B. 甲状腺功能亢进
 - C. 缩窄性心包炎、严重二尖瓣狭窄
 - D. 肺源性心脏病、活动性心肌炎
 - E. 重度贫血
64. 叶酸用于治疗巨幼红细胞性贫血，疗效较好的是
- A. 恶性贫血所致的巨幼红细胞性贫血
 - B. 营养性、妊娠期和婴儿期巨幼红细胞性贫血
 - C. 甲氨喋呤使二氢叶酸还原酶功能障碍所致的巨幼红细胞性贫血
 - D. 维生素 B_{12} 缺乏所致的巨幼红细胞性贫血
 - E. 肝脏因素所致的巨幼红细胞性贫血
65. 可造成乳酸血症的降血糖药是
- A. 格列吡嗪
 - B. 氯磺丙脲
 - C. 格列本脲
 - D. 甲苯磺丁脲
 - E. 二甲双胍
66. 传染病的基本特征为
- A. 有传染性、免疫性和病原体
 - B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
 - C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
 - D. 有传染性、传播途径和传染源
 - E. 有传染性、免疫性和流行性

67. 下列各项，可降低人群易感性的是
- A. 新生儿增加
 - B. 非流行区人口迁入
 - C. 免疫人口死亡等
 - D. 新的传染病出现或传入
 - E. 接种疫苗
68. 急性病毒性肝炎黄疸最早出现的部位是
- A. 手（脚）掌皮肤
 - B. 四肢皮肤
 - C. 口腔黏膜
 - D. 面部皮肤
 - E. 巩膜
69. 流感传染性最强的时期是
- A. 潜伏期
 - B. 发病 3 日内
 - C. 发病 1 周内
 - D. 发病 10 日内
 - E. 全病程
70. AIDS 发生卡波西肉瘤主要是由于
- A. 肺孢子菌感染
 - B. 人疱疹病毒 8 感染
 - C. 隐孢子虫感染
 - D. 巨细胞病毒感染
 - E. 弓形体感染
71. 下列各项，不是流行性出血热出血原因的是
- A. 血小板减少、形态异常和功能障碍
 - B. 尿毒症
 - C. 血管壁损伤
 - D. 凝血因子产生障碍
 - E. DIC 和继发性纤维蛋白溶解
72. 下列有关乙脑临床表现的描述，不典型的是
- A. 病理征常阳性
 - B. 发热越高，病情越重
 - C. 神志不清可于病程第 2 天出现
 - D. 呼吸衰竭以中枢，性为主
 - E. 病程 2 周后出现肢体瘫痪
73. 流脑暴发型脑膜脑炎型对症治疗的关键是
- A. 镇静，止惊
 - B. 降温，吸氧
 - C. 及时脱水治疗
 - D. 补充有效血容量
 - E. 使用肾上腺皮质激素
74. 中毒型菌痢好发年龄是
- A. 青壮年

- B. 10-14 岁
- C. 2~7 岁
- D. 2 岁以下
- E. 老年

75. 下列属于结核性脑膜炎临床表现的是

- A. 贫血
- B. 喷射性呕吐
- C. 肝脾大
- D. 消瘦
- E. 呼吸困难

76. 《中华人民共和国药品管理法》规定：执业医师收受药品生产经营企业给予财物或其他利益的违法行为情节严重的，由卫生行政部门给予的行政处罚是

- A. 警告、降职
- B. 处分、没收违法所得
- C. 吊销执业医师证书
- D. 吊销执业许可证
- E. 记过、没收违法所得

77. 每张处方常用量一般

- A. 不得超过七日
- B. 不得超过五日
- C. 不得超过三日
- D. 应为二日
- E. 应为三日

78. 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

- A. 病毒性肝炎
- B. 伤寒和副伤寒
- C. 淋病、梅毒
- D. 淋病、艾滋病
- E. 肺炭疽、传染性非典型性肺炎

79. 道德是在人们社会生活实践中形成的,是由()来决定的

- A. 经济基础
- B. 文化发展
- C. 意识形态
- D. 社会进步
- E. 科技发展

80. 人体试验中切实保护受试者利益的体现,下列哪一项除外

- A. 人体试验前必须经过动物实验
- B. 人体试验前必须制定严密科学的计划
- C. 人体试验前必须有严格的审批监督程序
- D. 人体试验前必须详细了解患者身心情况
- E. 人体试验结束后必须作出科学报告

81. 医学道德评价中自身评价是医务人员

- A. 对自己的心理感受所进行的反思
- B. 对自己的职业行为所作的评价

- C. 对周围同事的错误行为进行的批评
- D. 对行业内的不正之风所进行的评价
- E. 对所发生的医疗差错事故进行的分析

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

82. 患者，女，26 岁。产后 20 天，乳房胀痛，乳漏不止，要求回乳。用药应选用的药物是

- A. 炒麦芽
- B. 炒稻芽
- C. 炒神曲
- D. 炒山楂
- E. 炒槟榔

83. 患者，女，28 岁。月经提前 1 周，经量多，色鲜红，腰膝酸痛，五心烦热，舌质红，脉细数。下列各项，哪组药不可选用

- A. 生地黄、牡丹皮
- B. 牡丹皮、地骨皮
- C. 茜草、蒲黄
- D. 小蓟、旱莲草
- E. 艾叶、炮姜

84. 患者，男，45 岁。咳嗽痰少，时有咯血，潮热，自汗盗汗，神疲乏力，舌红少苔，脉数无力。用药应首选的药物是

- A. 川贝母、百部、紫菀
- B. 陈皮、半夏、芥子
- C. 紫苏子、莱子、芥子
- D. 黄芩、瓜蒌、鱼腥草
- E. 麻黄、桑白皮、地龙

85. 患者一侧头痛反复发作，并常伴恶心、呕吐，对光及声音过敏者，针灸治疗除局部穴外，宜主取的是

- A. 督脉及手、足太阳经穴
- B. 督脉及手、足少阳经穴
- C. 督脉及手、足阳明经穴
- D. 足厥阴及手、足阳明经穴
- E. 足厥阴及手、足少阳经穴

86. 患者右面部疼痛 2 年，间断发作，呈闪电样剧痛，持续数秒，痛时面部抽搐，伴流泪、有灼热感，舌红，苔薄黄，脉浮数。其辨证为

- A. 外感风寒
- B. 外感风热
- C. 气血瘀滞
- D. 肝胃郁热
- E. 阴虚阳亢

87. 患者 3 年来腰部时常酸痛，腰部肌肉僵硬，久坐加重，舌质淡暗，边有瘀点。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 膈俞、次髎
- B. 肾俞、足三里
- C. 命门、腰阳关
- D. 悬钟、太冲
- E. 肾俞、太溪

88. 患者头晕目眩，昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，舌淡，脉沉细。除主穴外，应选用

- A. 行间、侠溪、太溪
- B. 头维、丰隆、中脘
- C. 气海、脾俞、胃俞
- D. 太溪、悬钟、三阴交
- E. 血海、膈俞、内关

89. 患者3个月前突发高热，热退后出现周身乏力，下肢痿软无力，食少腹胀便溏，神疲乏力。治疗应主选的是

- A. 手足少阳经穴、夹脊穴
- B. 手足阳明经穴、夹脊穴
- C. 手足太阳经穴、夹脊穴
- D. 手足太阴经穴、夹脊穴
- E. 手足厥阴经穴、夹脊穴

90. 患者经常寐而醒，伴心悸健忘，面色无华，纳差倦怠，舌淡，脉细弱。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 行间、侠溪
- B. 心俞、脾俞
- C. 心俞、胆俞
- D. 太溪、肾俞
- E. 足三里、内关

91. 患者心慌心跳，头晕目眩，少寐，腰酸盗汗，舌红，脉细数。治疗除主穴外，宜加取

- A. 肾俞、太溪
- B. 胆俞、侠溪
- C. 脾俞、足三里
- D. 气海、阴陵泉
- E. 膻中、膈俞

92. 患者气逆咳嗽，引胁作痛，痰少而黏，面赤咽干，苔黄少津，脉弦数。针灸治疗应选取

- A. 列缺、合谷、肺俞、风门、太渊
- B. 列缺、合谷、肺俞、大椎、曲池
- C. 太渊、三阴交、肺俞、丰隆、阴陵泉
- D. 太渊、三阴交、肺俞、行间、鱼际
- E. 太渊、足三里、肺俞、膏肓、内庭

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(93~94 题共用题干)

- A. 洪脉、革脉、濡脉
 - B. 洪脉、濡脉、牢脉
 - C. 洪脉、革脉、紧脉
 - D. 牢脉、弱脉、虚脉
 - E. 弱脉、濡脉、虚脉
93. 具有脉搏无力特点的脉象是
94. 具有脉位表浅特点的脉象是

(95~96 题共用题干)

- A. 气血两虚
 - B. 阳衰气少
 - C. 湿阻脉道
 - D. 伤精血少
 - E. 失血伤阴
95. 虚脉的临床意义是
96. 微脉的临床意义是

(97~98 题共用题干)

- A. 舌中
 - B. 舌尖
 - C. 舌根
 - D. 舌边
 - E. 舌底
97. 肾在舌上的分属部位是
98. 肝在舌上的分属部位是

(99~100 题共用题干)

- A. 夜热早凉
 - B. 日晡潮热
 - C. 持续高热
 - D. 骨蒸发热
 - E. 身热不扬
99. 阴虚火旺发热的特点是
100. 余邪留伏发热的特点是

(101~102 题共用题干)

- A. 白带
 - B. 黄带
 - C. 赤带
 - D. 赤白带
 - E. 五色带
101. 寒湿下注多见的临床表现是
102. 湿热下注多见的临床表现是

(103~104 题共用题干)

- A. 先下
- B. 后下
- C. 烩化

D. 另煎

E. 包煎

103. 人参入药的用法是

104. 阿胶入药的用法是

(105~106 题共用题干)

A. 砒石

B. 炉甘石

C. 硫磺

D. 硼砂

E. 莲子

105. 具有清热解毒、清肺化痰功效的药物是

106. 具有攻毒杀虫、祛痰平喘功效的药物是

(107~108 题共用题干)

A. 清热生津，解暑除烦

B. 清热生津，化湿和中

C. 祛暑解表，化湿和中

D. 清暑解热，化气利湿

E. 祛暑解表，清热化湿

107. 香薷散的功用是

108. 新加香薷饮的功用是

(109~110 题共用题干)

A. 补血活血，化瘀生新

B. 养血和营，活血通络

C. 补血养肝，和血调经

D. 养血润燥，止逆下气

E. 补养心血，以安神志

109. 补阳还五汤中配伍当归的用意是

110. 苏子降气汤中配伍当归的用意是

(111~112 题共用题干)

A. 从胸走手

B. 从手走胸

C. 从手走头

D. 从头走足

E. 从胸腹走足

111. 手三阴经的循行走向规律是

112. 足三阳经的循行走向规律是

(113~114 题共用题干)

A. 太渊

B. 阳池

C. 后溪

D. 内关

E. 合谷

113. 既属于原穴，又属于八会穴的是

114. 既属于络穴，又属于八脉交会穴的是

(115~116 题共用题干)

- A. 破伤风
 - B. 铅中毒
 - C. 癫痫
 - D. 癔症性抽搐
 - E. 蛛网膜下腔出血
115. 抽搐前伴剧烈头痛的是
116. 抽搐伴瞳孔散大、意识丧失的是

(117~118 题共用题干)

- A. 心源性哮喘
 - B. 支气管哮喘
 - C. 支气管扩张
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 肺炎球菌性肺炎
117. 两肺散在干、湿啰音，其多少及部位不固定者，见于
118. 患侧呼吸运动减弱，叩诊浊音，可闻及支气管呼吸音者，见于

(119~120 题共用题干)

- A. 巨幼细胞贫血
 - B. 缺铁性贫血
 - C. 再生障碍性贫血
 - D. 溶血性贫血
 - E. 失血性贫血
119. 维生素 B₁₂ 或叶酸缺乏引起的贫血是
120. 红细胞破坏过多引起的贫血是

(121~122 题共用题干)

- A. 肾功能正常
 - B. 肾衰竭代偿期
 - C. 肾衰竭失代偿期
 - D. 肾衰竭期
 - E. 肾衰竭终末期
121. 当 Ccr 为 51~80mL/min 时，肾功能的分期是
122. 当 Ccr 为 50~20mL/min 时，肾功能的分期是

(123~124 题共用题干)

- A. 急性心肌梗死
 - B. 心绞痛
 - C. 急性心包炎
 - D. 主动脉夹层动脉瘤
 - E. 室壁瘤
123. 可引起 ST 段下移 0.07mV 的疾病是
124. 可引起 ST 段弓背向下抬高的疾病是

(125~126 题共用题干)

- A. 上消化道钡餐造影
- B. 小肠导管造影
- C. 钡剂灌肠

D. 腹部透视

E. 断层摄影

125. 胃溃疡应做的检查是

126. 结肠癌应做的检查是

(127~128 题共用题干)

A. 心房颤动

B. 心慌气短

C. 下肢浮肿

D. 二尖瓣狭窄

E. 风湿性心脏病

127. 属病因诊断的是

128. 属病理解剖诊断的是

(129~130 题共用题干)

A. 致畸作用

B. 继发反应

C. 致突变作用

D. 变态反应

E. 后遗效应

129. 发生于少数过敏体质者的病理性免疫反应是

130. 长期服用广谱抗生素后的肠道菌群平衡紊乱是

(131~132 题共用题干)

A. 氟西汀

B. 丙咪嗪

C. 氯丙嗪

D. 吗啡

E. 左旋多巴

131. 能同时阻断 α 受体、M 受体、D₂ 样受体的药物是

132. 能同时阻断组胺受体、M 受体及抑制神经元对 NA 和 5-HT 再摄取的药物是

(133~134 题共用题干)

A. 卡比多巴

B. 金刚烷胺

C. 溴隐亭

D. 苄丝肼

E. 安坦

133. 单独应用对帕金森病基本无作用的药物是

134. 常与左旋多巴制成复方制剂的药物是

(135~136 题共用题干)

A. 苯海拉明

B. 氯雷他定

C. 西替利嗪

D. 雷尼替丁

E. 酮替芬

135. 治疗晕动病的药物是

136. 预防性治疗支气管哮喘的药物是

(137~138 题共用题干)

- A. 美托洛尔
- B. 硝酸甘油
- C. 阿替洛尔
- D. 普萘洛尔
- E. 硝苯地平

137. 治疗稳定型心绞痛的首选药是

138. 治疗变异型心绞痛最有效的药物是

(139~140 题共用题干)

- A. 性传播
- B. 母婴传播
- C. 器官移植
- D. 输血
- E. 蚊虫叮咬

139. AIDS 的主要传播途径是

140. 一般认为不能传播 AIDS 的是

(141~142 题共用题干)

- A. 伤寒
- B. 乙脑
- C. 流感
- D. 流脑
- E. 霍乱

141. 首选青霉素治疗的是

142. 首选氧氟沙星治疗的是

(143~144 题共用题干)

- A. 中毒型菌痢
- B. 急性菌痢轻型
- C. 慢性菌痢隐匿型
- D. 急性菌痢普通型
- E. 慢性菌痢急性发作型

143. 急起发热，腹痛，腹泻，脓血便，可能的诊断是

144. 突起高热，面色青灰，出冷汗及脉细数，尿少，可能的诊断是

(145~146 题共用题干)

- A. 肠毒素
- B. 内毒素
- C. 类毒素
- D. 细胞毒素
- E. 神经毒素

145. 霍乱的主要致病因子是

146. 流脑的主要致病因子是

(147~148 题共用题干)

- A. 提供已确定的有效治疗作为对照
- B. 禁止买卖人类配子、受精卵、胚胎
- C. 研究人员、机构与商业实体有权利获得公平回报

- D. 科技必须考虑公共利益
- E. 应该保护个人、家庭与社群，防止歧视和侮辱

147. 属于《国际性研究中的伦理与政策问题:发展中国家的临床试验》（2001）年的内容的是

148. 属于《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》（2003年）的内容的是
（149~150题共用题干）

- A. 依照《治安管理处罚条例》处罚
- B. 依法给予行政处分
- C. 对负责人给予行政处分
- D. 给予行政处罚
- E. 给予民事制裁

149. 对阻碍医师依法执业的违法行为

150. 医疗机构对注销注册医师资格情形不报造成严重后果的应

答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	B	E	E	A	E	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	C	D	D	B	D	D	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	B	A	A	C	E	A	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	D	B	E	C	E	B	D	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	E	B	B	B	D	A	D	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	B	A	B	E	D	D	E	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	A	A	B	E	C	E	E	B	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	E	C	C	B	C	A	E	A	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	E	A	E	B	A	D	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	D	E	A	A	B	C	D	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	B	D	C	D	A	C	E	B	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	D	A	D	E	C	D	E	A	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
B	C	B	C	A	C	E	D	D	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	B	A	A	A	E	B	E	A	E
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

D	A	D	A	A	B	A	B	A	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

中西医模拟试卷

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列有关急性上呼吸道感染的发病机制，说法错误的是
 - 多由细菌引起，少数为病毒所致
 - 全年皆可发病，以冬春季多发
 - 病毒和细菌等可通过飞沫传播
 - 发病与年龄、体制密切相关
 - 病程较短，预后较好
- 急性上呼吸道感染的治疗不包括
 - 镇咳治疗
 - 抗病毒治疗
 - 抗感染治疗
 - 局部灌注
 - 抗过敏治疗
- 发现肺癌的最基本的检查是
 - 胸部 X 线检查
 - 痰脱落细胞学检查
 - 放射性核素扫描检查
 - 癌标志物检测
 - 纤维支气管镜检查
- 下列各项中，不属于病态窦房结综合征心电图表现的是
 - 持续、严重，有时是突发的窦性心动过缓
 - 发作时可见窦房阻滞或窦性停搏
 - 心动过缓与心动过速交替出现
 - 心动过速可以是阵发性室上速、阵发性房颤与房扑
 - 心率 > 50 次/分
- 风心病二尖瓣狭窄患者如听到第一心音亢进并有二尖瓣开瓣音，提示
 - 二尖瓣弥漫性钙化
 - 漏斗形二尖瓣狭窄伴有关闭不全
 - 二尖瓣瓣叶增厚
 - 二尖瓣前叶尚较柔软、活动度好
 - 二尖瓣功能丧失
- 病毒性心肌炎最常见的病因是
 - 柯萨奇 B 组病毒
 - 柯萨奇 A 组病毒
 - 脊髓灰质炎病毒
 - 孤儿 (ECHO) 病毒
 - 人类腺病毒

7. 非甾体抗炎药引起急性胃炎的主要机制是
- A. 激活磷脂酶 A
 - B. 抑制前弹性蛋白酶
 - C. 抑制前列腺素合成
 - D. 促进胃泌素合成
 - E. 抑制脂肪酶
8. 下列各项中，关于消化性溃疡病理的叙述，错误的是
- A. 溃疡的直径一般小于 2.5cm
 - B. 溃疡愈合一般需要 4-8 周
 - C. 溃疡呈圆形或椭圆形
 - D. 多发性溃疡不少见
 - E. 溃疡的边缘不整齐
9. 早期胃癌是指
- A. 仅累及黏膜层
 - B. 病变直径 < 1cm
 - C. 无淋巴结转移
 - D. 黏膜层平坦型病变
 - E. 仅累及黏膜和黏膜下层
10. 下列各项中，与肝硬化发病无明显关系的是
- A. 酒食不节
 - B. 情志失调
 - C. 感染血吸虫
 - D. 黄疸、积聚日久
 - E. 感受外邪
11. 诊断溃疡性结肠炎最有价值的方法是
- A. 纤维结肠镜检查
 - B. 血液检查
 - C. 粪便检查
 - D. 钡剂灌肠检查
 - E. 黏膜组织学检查
12. 慢性肾小球肾炎与慢性肾盂肾炎的鉴别，有诊断意义的是
- A. 尿比重有改变
 - B. 影像学检查见双肾非对称性损害，呈肾间质性损害影像
 - C. 尿常规示蛋白尿、血尿
 - D. 病因
 - E. 服用抗生素有效
13. 中医学认为，缺铁性贫血的基本病机是
- A. 饮食失调
 - B. 气血生化不足
 - C. 虫积日久
 - D. 久病体虚
 - E. 先天禀赋不足
14. 急性原发性免疫性血小板减少症多见于
- A. 老人

- B. 壮年
- C. 青年
- D. 儿童
- E. 婴儿

15. 有关骨髓增生异常综合征实验室检查的论述，错误的是

- A. 持续性（ ≥ 6 个月）一系或多系血细胞减少
- B. 血红蛋白 $< 110\text{g/L}$
- C. 中性粒细胞 $< 1.5 \times 10^9/\text{L}$
- D. 血小板 $< 100 \times 10^9/\text{L}$
- E. 骨髓增生度减低，少部分活跃

16. 既往有哮喘病史的甲状腺功能亢进症病人，不宜使用的药物是

- A. 丙基硫氧嘧啶
- B. 甲基硫氧嘧啶
- C. 甲硫咪唑
- D. 心得安
- E. 卡比马唑

17. 反映甲状腺功能最有价值的指标是

- A. FT_3
- B. FT_4
- C. T_3
- D. T_4
- E. TSH

18. 磺脲类药降糖的主要机制是

- A. 加速无氧糖酵解
- B. 促进外周组织摄取葡萄糖
- C. 抑制肠道对葡萄糖的吸收
- D. 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- E. 促使靶细胞胰岛素受体亲和力增强

19. 糖尿病微血管并发症是

- A. 糖尿病肾病
- B. 糖尿病性冠心病
- C. 糖尿病足
- D. 糖尿病下肢动脉硬化闭塞症
- E. 糖尿病性脑血管病

20. 有关血脂异常的中医病因病机，说法错误的是

- A. 病位在心、脾、肾、肝
- B. 病性多为本虚标实
- C. 本虚为脏腑亏虚
- D. 标实为痰浊瘀血，阻滞经脉
- E. 病因与素体肥胖，加之饮食不节有关

21. 导致血脂异常发病的关键因素是

- A. HDL-C 升高
- B. HDL-C 降低
- C. TG 升高

- D. LDL-C 升高
 - E. LDL-C 降低
22. 类风湿关节炎的基本病理改变是
- A. 皮肤炎
 - B. 滑膜炎
 - C. 心包炎
 - D. 血管炎
 - E. 心肌炎
23. 下列各项中，不能改善关节炎症状的药物是
- A. 甲氨蝶呤
 - B. 布洛芬
 - C. 萘普生
 - D. 双氯芬酸
 - E. 吲哚美辛
24. 下列各项中，关于癫痫休止期的中医分型错误的是
- A. 瘀阻窍证
 - B. 肝肾阴虚证
 - C. 脾虚痰湿证
 - D. 痰湿蕴肺证
 - E. 肝火痰热证
25. 以“三偏征”为特征的动脉闭塞是
- A. 颈内动脉闭塞
 - B. 大脑中动脉主干闭塞
 - C. 大脑中动脉皮层支闭塞
 - D. 大脑中动脉深穿支闭塞
 - E. 椎-基底动脉闭塞
26. 中毒是指
- A. 物理因素引起的损害
 - B. 有毒化学物质引起的损害
 - C. 细菌感染引起的损害
 - D. 放射性物质引起的损害
 - E. 药物引起的损害
27. 心源性休克，治疗应首选的血管活性药物是
- A. 多巴胺
 - B. 心得安
 - C. 肾上腺素
 - D. 去甲肾上腺素
 - E. 地塞米松
28. 虚痞之胃阴不足证，治疗首选方剂是
- A. 保和丸
 - B. 二陈汤
 - C. 益胃汤
 - D. 越鞠丸
 - E. 平胃汤

29. 积证与鼓胀的鉴别点是
- A. 有无结块可扪及
 - B. 有无腹痛
 - C. 有无噎气、腹胀
 - D. 有无腹水
 - E. 有无腹部胀大
30. 治疗郁证之肝气郁结证，应首选的方剂是
- A. 柴胡疏肝散
 - B. 丹栀逍遥散
 - C. 归脾汤
 - D. 四逆散
 - E. 痛泻要方
31. 下列不属于“外感六淫”的是
- A. 风
 - B. 寒
 - C. 暑
 - D. 湿
 - E. 痰
32. 下列不是麻醉前用药目的是
- A. 解除术前紧张和恐惧
 - B. 控制不良反应
 - C. 增强麻醉效果
 - D. 延长麻醉有效时间
 - E. 拮抗麻醉药副作用
33. 术后止痛的主要途径不包括
- A. 镇痛泵止痛
 - B. 镇痛剂止痛
 - C. 神经阻滞止痛
 - D. 椎管内给药
 - E. 吸入麻醉
34. 成人头、面、颈部全部烧伤，其面积约为全身面积的
- A. 3%
 - B. 6%
 - C. 9%
 - D. 18%
 - E. 20%
35. 腹腔内抽出液体淀粉酶升高，其损伤部位是
- A. 肝脏
 - B. 胆囊
 - C. 脾脏
 - D. 胰腺
 - E. 小肠
36. 恶性肿瘤的临床特征是
- A. 有包膜，不侵犯周围组织

- B. 膨胀性生长
 - C. 易转移
 - D. 活动度大
 - E. 不易复发
37. 以下哪个不属于乳房淋巴液输出途径中的淋巴结
- A. 腋窝淋巴结
 - B. 锁骨上淋巴结
 - C. 颌下淋巴结
 - D. 胸骨旁淋巴结
 - E. 锁骨下淋巴结
38. 急性阑尾炎热毒证者宜用
- A. 大黄牡丹汤合红藤煎加减
 - B. 大柴胡汤
 - C. 大黄牡丹汤合透脓散加减
 - D. 大陷胸汤
 - E. 龙胆泻肝汤
39. 急性持续性腹痛，阵发性加剧伴休克，最大可能是
- A. 输尿管结石、肾绞痛
 - B. 单纯性机械性肠梗阻
 - C. 急性阑尾炎
 - D. 绞窄性肠梗阻
 - E. 肠扭转牵拉肠系膜
40. 急性细菌性前列腺炎，治疗应首选抗生素是
- A. 喹诺酮类抗生素
 - B. 复方新诺明
 - C. 青霉素
 - D. 红霉素
 - E. 头孢类抗生素
41. 子宫最狭窄的部分是
- A. 组织学内口
 - B. 解剖学内口
 - C. 宫颈管
 - D. 子宫峡部
 - E. 子宫外口
42. 下列关于妊娠期子宫变化的叙述，错误的是
- A. 孕卵着床后，子宫内膜受孕激素的影响发生蜕膜变
 - B. 妊娠后期多数子宫有不同程度的右旋
 - C. 足月妊娠时，子宫下段可达7~10cm
 - D. 妊娠晚期，子宫呈球形且不对称
 - E. 妊娠晚期，子宫肌细胞肥大，长约500 μ m，宽10 μ m
43. 惊恐伤肾，恐则气下，导致的妇科疾病是
- A. 月经先期
 - B. 月经后期
 - C. 月经过多

- D. 月经过少
E. 闭经
44. 妊娠期间，羊水过多为羊水量超过
- A. 500mL
B. 1000mL
C. 1500mL
D. 2000mL
E. 2500mL
45. 下列各项，属横产式的胎位是
- A. 持续性枕横位
B. 臀位
C. 横位
D. 持续性枕后位
E. 枕左前位
46. 产后关节痛的治疗大法是
- A. 养血活血，通络止痛
B. 调和营卫，通络止痛
C. 补肾强腰，通络止痛
D. 大补气血，调和营卫
E. 补肾壮骨，化瘀止痛
47. 崩漏的发生机制是
- A. 冲任损伤，不能制约经血
B. 任带损伤，不能制约经血
C. 任督损伤，不能制约经血
D. 肾虚不固，不能封藏经血
E. 瘀阻冲任胞宫，血不归经
48. 治疗气滞血瘀型子宫肌瘤，应首选的方剂是
- A. 血府逐瘀汤
B. 抵挡汤
C. 膈下逐瘀汤
D. 清宫消癥汤
E. 少腹逐瘀汤
49. 下列各项，不属良性葡萄胎临床表现的是
- A. 阴道流血
B. 痰中带血
C. 贫血
D. 妊高征
E. 甲亢
50. 下列各项，属II度重型子宫脱垂临床表现的是
- A. 下坠感
B. 外阴部有肿物脱出
C. 排尿困难
D. 排便困难
E. 张力性尿失禁

51. 寒湿阻滞型新生儿黄疸的中医治法是
- A. 清热利湿退黄
 - B. 活血化瘀退黄
 - C. 温中化湿退黄
 - D. 清肝利胆退黄
 - E. 温阳健脾退黄
52. 小儿肺炎喘嗽的中医病机是
- A. 肺气失宣
 - B. 肺失肃降
 - C. 肺气闭郁
 - D. 邪客肺卫
 - E. 外邪触动伏痰
53. 治疗哮喘肾虚不纳证的首选方剂是
- A. 右归饮
 - B. 金匱肾气丸
 - C. 左归饮
 - D. 六味地黄丸
 - E. 人参大补丸
54. 诊断病毒性心肌炎最常作的检查是
- A. 心电图
 - B. 心电向量
 - C. 螺旋 CT
 - D. 胸部 X 线摄片
 - E. 心脏彩色多普勒检查
55. 诊断单纯性肾病综合征必备的条件是
- A. 大量蛋白尿、低白蛋白血症
 - B. 不同程度的水肿
 - C. 血沉明显增快
 - D. 血胆固醇增高
 - E. 血清补体正常
56. 免疫性血小板减少症血热伤络证的治法是
- A. 清热解毒，凉血止血
 - B. 清热解毒，凉血宁络
 - C. 滋阴清热，凉血宁络
 - D. 益气健脾，摄血养血
 - E. 活血化瘀，理气止血
57. 过敏性紫癜风热伤络证的首选方剂是
- A. 大蓟饮子
 - B. 小蓟饮子
 - C. 四妙散
 - D. 银翘散
 - E. 清营汤
58. 早期诊断佝偻病的实验室依据是
- A. 血常规

B. 血清中 25-(OH) D₃、和 1, 25-(OH)₂D₃

C. 血清磷

D. 血清钙

E. 尿常规

59. 下列关于麻疹皮疹的特点，错误的是

A. 疹间有正常皮肤

B. 发热 3~4 天出疹

C. 发疹有一定顺序

D. 暗红色斑丘疹

E. 疹退后四肢有大片状脱皮

60. 蛲虫的主要临床表现是

A. 腹痛

B. 腹泻

C. 贫血

D. 便血

E. 肛门瘙痒

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

61. 某女，恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体酸痛，鼻塞声重，喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，口不渴或喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。其中医治法是

A. 清暑祛湿解表

B. 辛凉解表

C. 辛温解表

D. 滋阴解表

E. 温阳解表

62. 某女，咳嗽咽痒，声重气急，痰稀色白，头痛鼻塞，流清涕，骨节酸痛，恶寒，发热，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。其中医治法是

A. 疏风清热，宣肺止咳

B. 疏风散寒，宣肺止咳

C. 疏风清肺，润燥止咳

D. 轻宣凉燥，润肺止咳

E. 温肺化饮，散寒止咳

63. 张某，女，43 岁，1 个月来干咳，胸闷憋气，呼吸困难，夜间明显，影响睡眠，既往有类似发作病史，双肺可闻及哮鸣音。治疗应首选的药物是

A. 口服安定

B. 雾化吸入色甘酸钠

C. 吸入特布他林，口服茶碱控释片

D. 静脉滴注琥珀酸氢化可的松

E. 氧气吸入

64. 某男，29 岁，因寒战、高热、咳嗽、胸痛 4 天入院。查体：血压 110/70mmHg，急性病容，呼吸急促，口唇发绀，右下肺可听到支气管呼吸音。X 线示：肺段大片、均匀炎症浸润阴影。血常规：白细胞 $11.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.76。其诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 克雷白杆菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 肺炎球菌肺炎

65. 张某，突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸急促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数。其中医治法是

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 清热化痰，宽胸止咳
- C. 清热解毒，化痰开窍
- D. 益气养阴，润肺化痰
- E. 解表散寒，清泄里热

66. 某患者，男性，70岁。患咳喘病20年，近来加重。现症见咳喘，心悸怔忡，不能平卧，动则尤甚，腹部胀满，浮肿，肢冷尿少，面青唇绀，舌胖紫暗，苔白滑，脉沉细结代。其治疗应首选的方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 独参汤
- C. 补肺汤合参蛤散
- D. 二陈汤合三子养亲汤
- E. 真武汤合五苓散

67. 男性患者，75岁。突然晕厥。查体：神志淡漠，血压85/65mmHg，心率38次/分，四肢湿冷。心电图示急性下壁心肌梗死，III度房室传导阻滞。应首选的治疗措施是

- A. 异丙肾上腺素静脉滴注
- B. 阿托品静脉滴注
- C. 安装临时心脏起搏器
- D. 安装永久性心脏起搏器
- E. 肾上腺皮质激素

68. 患者男性，56岁，心脏骤停后出现室性心动过速，电击后仍没有好转，应首选的药物是

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- D. 洋地黄
- C. 阿托品
- E. 安定

69. 患者男性，60岁。急性广泛前壁心肌梗死2天，晕脱2次，心室率40次/分，律齐，心电图示III度房室传导阻滞。治疗应首选的措施是

- A. 麻黄素
- B. 人工心脏起搏器
- C. 异丙肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 溴苯辛

70. 患者患有病毒性心肌炎，现发热微恶寒，头身疼痛，鼻塞流涕，咽痛口渴，口干口苦，小便黄赤，心悸气短，胸闷，舌红苔薄黄，脉浮数。其治疗首选方剂是

- A. 葛根芩连汤合甘露消毒丹

- B. 天王补心丹加减
- C. 炙甘草汤合生脉散
- D. 参附养荣汤
- E. 银翘散

71. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 生脉饮
- C. 滋水清肝饮
- D. 益胃汤
- E. 玉女煎

72. 男性，30岁。无规律上腹隐痛3个月，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，神疲乏力，舌质淡红，苔薄白，脉沉细。胃镜下可见黏膜呈灰白色，血管暴露。其病证结合诊断是

- A. 慢性萎缩性胃炎+脾胃虚弱证
- B. 慢性萎缩性胃炎+胃阴不足证
- C. 胃溃疡+胃阴不足证
- D. 胃溃疡+脾胃虚弱证
- E. 慢性浅表性胃炎+脾胃虚弱证

73. 患者男性，36岁。已诊断消化性溃疡。近期出现脱水、电解质和酸碱平衡紊乱及营养缺乏，应首先考虑的原因是

- A. 厌食
- B. 并发胃炎
- C. 出血
- D. 疼痛
- E. 幽门梗阻

74. 患者，男性，50岁。现脘膈痞闷，呕吐痰涎，进食发噎不利，口淡纳呆，大便时结时溏，舌体胖大，有齿痕、苔白厚腻，脉滑。其中医治法是

- A. 疏肝和胃，降逆止痛
- B. 理气化痰，消食散结
- C. 燥湿健脾，消痰和胃
- D. 理气活血，软坚消积
- E. 理气活血，消痰和胃

75. 患者，男性，35岁。泄泻20余年，诊断为溃疡性结肠炎。稍进油腻之品，大便次数增多，水谷不化，脘腹胀闷不舒，面色萎黄，肢倦乏力，纳食减少，舌淡苔白，脉细弱。其治疗应首选

- A. 白头翁汤
- B. 参苓白术散
- C. 胃苓汤
- D. 痛泻要方
- E. 驻车丸

76. 患者，男性，44岁，腹痛腹泻反复发作3年，症状时轻时重，每日排便4-5次，便中带脓血。便常规：WBC5个/高倍视野，RBC10个/高倍视野；肠镜提示：黏膜上有多发性浅溃疡，黏膜充血、水肿，附有脓血性分泌物。其诊断应首先考虑为

- A. 血吸虫病
- B. Crohn 病
- C. 结肠癌
- D. 肠结核
- E. 溃疡性结肠炎

77. 陈某，女，32岁。劳累后出现尿频、尿急、尿痛，高热、寒战、头痛、周身酸痛、恶心、呕吐，体温39.4℃，肾区叩击痛。尿常规示潜血(+++)，蛋白(+)，镜检见大量红细胞、白细胞；血常规WBC明显升高，中性粒细胞82%；B超示：肾外形凹凸不平，两肾大小不等。应考虑的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎急性发作

78. 7岁患儿，面色无华，血常规检查血红蛋白87g/L，腹胀，善食易饥，恶心呕吐，嗜食生米、泥土、茶叶等，神疲肢软，气短头晕，舌质淡，苔白，脉虚弱。其中医治法是

- A. 杀虫消积，养心安神
- B. 益气补血，养心安神
- C. 健脾和胃，益气养血
- D. 活血化瘀，益气养阴
- E. 杀虫消积，补益气血

79. 患者安某，服用氯霉素后出现乏力、出汗、周身不适，外周血象粒细胞计数为 $3.0 \times 10^9/L$ 。就诊时面色萎黄，头晕目眩，倦怠乏力，少寐多梦，心悸怔忡，纳呆食少，腹胀便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+气血两虚证
- B. 白细胞减少症+肝肾阴虚证
- C. 白血病+肝肾阴虚证
- D. 白细胞减少症+外感温热证
- E. 白细胞减少症+气血两虚证

80. 患者因腹胀就诊，查体脾脏增大至脐下，质地坚实，表面光滑，切迹明显，无压痛，血象检查白细胞为 $80 \times 10^9/L$ ，中性杆状核和晚幼粒细胞为多，骨髓象见各系细胞极度增生，以粒系为主，粒:红比例增至30:1，应首先考虑的诊断是

- A. 急性淋巴细胞性白血病
- B. 慢性淋巴细胞性白血病
- C. 急性髓细胞白血病
- D. 慢性髓细胞白血病
- E. 类白血病反应

81. 患者张某，甲状腺肿大半年，有时心悸，多汗，食欲亢进，大便次数增多，每天2~3次，查甲状腺II度肿大，无触痛，可闻及血管杂音， ^{131}I 摄取率3小时25%，24小时75%， T_3 抑制试验抑制率 $<50\%$ 。应首选的治疗措施是

- A. 立即手术治疗
- B. 普萘洛尔
- C. 他巴唑
- D. 复方碘液

E. 放射性核素治疗

82. 患者，男性，60岁，口渴欲饮6年，近半年小便频数，混浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 七味白术散
- B. 金匱肾气丸
- C. 六味地黄丸
- D. 玉女煎
- E. 消渴方

83. 某患者，形体肥胖，肢体困重，食少纳呆，腹胀纳呆，胸腹满闷，头晕神疲，大便溏薄，舌体胖，边有齿痕，苔白腻。其治法应是

- A. 滋养肝肾
- B. 活血化瘀，行气止痛
- C. 健脾化痰降浊
- D. 温阳化湿
- E. 清胃泄热

84. 患者女性，发热4天，体温38℃，两膝关节肿痛，行动不便，下肢沉重酸胀，伴饮食无味，纳呆，偶有恶心呕吐，全身困乏无力，下肢浮肿，在某医院诊断为类风湿关节炎，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 丁氏清络饮
- B. 四妙丸
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 独活寄生汤
- E. 身痛逐瘀汤

85. 男孩，突然意识短暂丧失，面色变白，双目凝视，手中的筷子掉在地下，口角出现细小颤动，持续约15秒后立即清醒。其诊断是

- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫不典型失神发作
- C. 癫痫典型失神发作
- D. 精神运动性癫痫
- E. 癫痫单纯部分性运动性发作

86. 患者痼疾久发，头晕目眩，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

87. 某男，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，遂急送医院。查体：体温37℃，血压130/70mmHg，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率60次/分，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。其诊断是

- A. 有机磷杀虫药中毒
- B. 酒精中毒
- C. 一氧化碳中毒

- D. 中暑
- E. 安定中毒

88. 患者，男，58岁，神志淡漠，面色苍白，冷汗淋漓，四肢厥冷，息促气微，体温不升，舌淡，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 大承气汤
- B. 生脉散
- C. 四逆汤
- D. 三甲复脉汤
- E. 炙甘草汤

89. 不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。其中医治法是

- A. 补益心脾，养血安神
- B. 清热化痰，和中安神
- C. 滋阴降火，交通心肾
- D. 益气镇惊，安神定志
- E. 疏肝泻火，镇心安神

90. 某患者，身目俱黄，色泽鲜明，发热口渴，腹部胀满，口干，口苦，恶心呕吐，胁胀痛而拒按，小便赤黄、短少，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 茵陈蒿汤
- C. 茵陈四苓散
- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

91. 患者鼓胀，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖、质紫，苔淡白，脉沉细无力。其中医治法为

- A. 清热利湿，攻下逐水
- B. 温补脾肾，化气利水
- C. 活血化瘀，行气利水
- D. 温中健脾，行气利水
- E. 疏肝理气，运脾利湿

92. 患者，男性，33岁，手术后出现厌食，恶心，肢体软弱无力，脉搏细快，肢端湿冷，出现休克，属

- A. 轻度缺水
- B. 中度缺水
- C. 重度缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

93. 患者，溃疡病史10年，反复上腹部疼痛、反酸、嗝气，近几天反复呕吐宿食，可能出现的酸碱平衡失调是

- A. 低氯性酸中毒
- B. 低氯性碱中毒
- C. 高氯性酸中毒
- D. 高氯性碱中毒

E. 高钾合并酸中毒

94. 患者，男，45岁。烧伤后见精神恍惚，语声低微，口唇紫绀，四肢厥冷，舌暗紫，有瘀点，脉细数。除相关西医治疗外，首选的中医治疗方药是

- A. 清营汤加减
- B. 人参养营汤加减
- C. 四味回阳饮加减
- D. 保元汤合固阳汤加减
- E. 独参汤合四逆汤加减

95. 患者，男，60岁。右足划伤3天，局部沉重疼痛，持续加重，迅速向上蔓延，伤口大量液体渗出并可见气泡冒出。应首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 妥布霉素
- D. 氧氟沙星
- E. 甲硝唑

96. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部疼痛不剧烈，逐渐出现头昏、胸闷、恶心、四肢乏力、眼睑下垂、语言不利等。最可能所咬的蛇毒种类为

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

97. 患者，女，40岁，颈部肿大，两侧对称，肿块质硬，表面光滑，甲状腺功能减退，抗甲状腺抗体阳性，病初有甲亢表现。应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 慢性侵袭性甲状腺炎
- C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- D. 甲状腺腺瘤
- E. 甲状腺癌

98. 患者，女，18岁，左乳外上象限一黄豆大小肿块，质地坚韧，表面光滑，边缘清楚，与周围组织无粘连，极易推动，挤压无乳头溢液。应首先考虑的诊断是

- A. 乳腺囊性增生症
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺导管扩张症
- E. 急性乳腺炎

99. 患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，发生大量呕血，考虑食管胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

- A. 三腔二囊管压迫
- B. 胃内注射或口服去甲肾上腺素
- C. 胃管注入冰水
- D. 使用生长抑素
- E. 内镜治疗

100. 患者，男，55岁，胁下积块，腹大如鼓，黄疸日深，纳果乏力，小便短赤，腹水

肢肿。应首先考虑的中医诊断是

- A. 瞪膈
- B. 鼓胀
- C. 伏梁
- D. 肺积
- E. 反胃

101. 患者，女，35岁。新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，冷汗淋漓，四肢厥逆，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 升举大补汤
- B. 独参汤
- C. 生脉散
- D. 人参黄芪汤
- E. 圣愈汤

102. 患者，女，48岁。外阴瘙痒逐渐加重3年，抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕，黏膜变白，皮肤变薄、干燥、失去弹性。首先应考虑的诊断是

- A. 外阴增生型营养不良
- B. 外阴硬化性苔藓
- C. 外阴白癜风
- D. 外阴银屑病
- E. 外阴湿疹

103. 患者，女，24岁，未婚。近半年经前经期烦躁易怒，头痛头晕，口苦咽干，面红目赤，口舌生疮，溺黄便干，经行吐衄；舌质红，苔薄黄，脉弦滑数。其中医治法是

- A. 疏肝解郁，养血调经
- B. 温肾健脾，化湿调经
- C. 疏肝解郁，清热调经
- D. 理气活血，化瘀调经
- E. 清热化痰，宁心安神

104. 患者，女，32岁。经后小腹隐痛，经量少、色淡，腰腿酸软，头晕耳鸣，舌淡红，脉沉细。其中医证型是

- A. 气血虚弱型
- B. 肝肾亏虚型
- C. 阳虚内寒型
- D. 脾肾阳虚型
- E. 肾阴不足型

105. 患者，女，50岁，丧偶。近1年月经紊乱，现阴道流血3个月余，量时多时少，伴有烘热汗出，心烦不寐。应首选的治疗措施是

- A. 药物止血
- B. 激素替代疗法
- C. 中医辨证治疗
- D. 药物性刮宫
- E. 诊断性刮宫

106. 患者，女，35岁。近半年感下腹部有一包块，固定不移，胀痛拒按，面色晦暗，舌边有瘀点，脉沉涩。B超示：子宫肌瘤。治疗应首选的方剂是

- A. 银甲丸

- B. 膈下逐瘀汤
- C. 失笑散
- D. 温经汤
- E. 桂枝茯苓丸

107. 患者，女，41岁，G2P1。诊断为葡萄胎，子宫超过孕14周大。应首选的治疗措施是

- A. 清除宫腔内容物
- B. 手术切除子宫
- C. 先清宫再切除子宫
- D. 化疗
- E. 先化疗再清宫

108. 患者，女，38岁。痛经6年，每于经前小腹冷痛，经血色暗、有块，形寒肢冷，面色苍白，舌紫暗，苔薄白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 艾附暖宫丸

109. 患者，女，27岁。结婚2年未孕，月经2~3月一行，量或多或少，头晕耳鸣，腰酸腿软，舌淡，苔薄，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 开郁种玉汤
- B. 养精种玉汤
- C. 归肾丸
- D. 毓麟珠
- E. 温胞饮

110. 患儿，女，3个月。口腔、舌面满布白屑，面赤唇红，烦躁不宁，吮乳啼哭，大便干结，小便短黄。治疗首选制霉菌素应加用的药物是

- A. 清胃散
- B. 泻黄散
- C. 六味地黄丸
- D. 导赤散
- E. 清热泻脾散

111. 患儿，11岁。面色萎黄，精神疲惫，食欲不振，喉中作声，四肢肌肉抽动，时轻时重，舌质淡红，舌苔白腻、脉沉弦无力。治疗应首选的方剂是

- A. 清肝达郁汤
- B. 礞石滚痰丸加减
- C. 醒脾散加减
- D. 大定风珠加减
- E. 千金龙胆汤加减

112. 患儿，3岁。营养性缺铁性贫血，症见面色萎黄，唇甲淡白，发黄枯燥，容易脱落，心悸气短，头晕目眩，夜寐欠安，语声低微，精神萎靡，食欲不振，舌淡红，苔薄白，脉细弱，指纹淡红。其首选方剂是

- A. 左归丸
- B. 右归丸

C. 参苓白术散

D. 归脾汤

E. 异功散

113. 女孩，6岁，因“乳房增大，身高增长加速近1年，阴道出血3天”来院就诊。查体：身高120cm，手腕X片示：骨龄9岁，乳房B4期，阴毛P2期，最可能的诊断是

A. 单纯性乳房早发育

B. 特发性性早熟

C. McCune-Albright 综合征

D. 先天性肾上腺皮质增生

E. 原发性甲减伴性早熟

114. 患儿，8岁。紫癜时发时止，低热盗汗，心烦少寐，小便黄赤，大便干燥，舌光红，苔少，脉细数。其证候是

A. 肝肾阴虚

B. 气滞血瘀

C. 风热伤络

D. 血热妄行

E. 气不摄血

115. 患儿，5个月。多汗夜惊，烦躁易哭，方颅，前2cm×2cm，方颅，形体虚胖，肌肉松软。其治疗首选方剂是

A. 玉屏风散

B. 人参五味子汤

C. 牡蛎散

D. 四君子汤

E. 八珍汤

116. 患儿，3岁。麻疹见疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。其证型是

A. 麻疹逆证，麻毒闭肺

B. 麻疹逆证，热毒攻喉

C. 麻疹逆证，邪陷心肝

D. 麻疹顺证，初热期

E. 麻疹顺证，见形期

117. 患儿，6岁。双侧腮腺漫肿已5天。近日热退腮肿渐消退，现又出现睾丸肿痛，痛引辜腹，治疗应首选方剂是

A. 银翘散

B. 导赤散

C. 温胆汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 丹栀逍遥丸

118. 患儿，2岁。素喜肉食，2天前过食海鲜后出现腹胀暖气，食欲减退，口中秽气重，大便3天未行，舌质红，苔黄腻。其治法是

A. 消食导滞

B. 健脾化积

C. 清肝理脾

D. 通腹泄热

E. 理气和中

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(119~120 题共用选项)

- A. 房性期前收缩
- B. 房性期前收缩未下传
- C. 交界性期前收缩
- D. 交界性逸搏
- E. 室性期前收缩

119. 提早出现 QRS 波，宽 0.12 秒，其前无相关 P 波，其诊断是

120. 提早出现 P 波，形态与窦性 P 波略有不同，QRS 形态正常，代偿间歇不完全其诊断是

(121~122 题共用选项)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 左归丸
- C. 枳实薤白桂枝汤
- D. 补阳还五汤
- E. 右归丸

121. 治疗心绞痛心肾阴虚证，应首选的方剂是

122. 治疗心绞痛心肾阳虚证，应首选的方剂是

(123~124 题共用选项)

- A. 吞咽困难
- B. 上腹痛
- C. 恶心
- D. 体重下降
- E. 饱胀感

123. 属于胃癌并发症引起的症状是

124. 属于胃癌溃烂引起的症状是

(125~126 题共用选项)

- A. 丙酸睾酮
- B. 输注全血
- C. 造血干细胞移植
- D. 抗生素
- E. 输注红细胞

125. 治疗再障应首选的药物是

126. 再障见严重贫血者应首选的措施是

(127~128 题共用选项)

- A. 寒痛
- B. 气痛
- C. 湿痛
- D. 痰痛

E. 瘀血痛

127. 皮色不红、不热，酸痛，多见于脱疽的是

128. 疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛的是

(129~130 题共用选项)

A. 停止输血，积极抗休克，维持循环功能，保护肾功能和防治弥散性血管内凝血

B. 保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作

C. 主要措施为抗休克、抗感染

D. 立即停止输血，半坐位，吸氧和利尿

E. 立即减慢输血速度，严重者停止输血

129. 针对输血后的发热反应，应采取

130. 针对输血的细菌污染反应，应采取

(131~132 题共用选项)

A. 间羟胺

B. 硝普钠

C. 去甲肾上腺素

D. 异丙肾上腺素

E. 西地兰

131. 治疗休克的强心药是

132. 治疗休克的血管扩张剂是

(133~134 题共用选项)

A. I° 烧伤

B. 浅 II° 烧伤

C. 深 II° 烧伤

D. III° 烧伤

E. 轻度烧伤

133. 红斑性烧伤是

134. 焦痂性烧伤是

(135~136 题共用选项)

A. 月经间隔时间正常，但经期延长 9~10 天

B. 月经周期紊乱，经期长短不一，出血量时多时少

C. 月经周期缩短，月经频发

D. 月经周期正常，量少

E. 月经中期出血，量少

135. 子宫内膜脱落不全的主要表现是

136. 黄体功能不足的主要表现是

(137~138 题共用选项)

A. 痛重于胀

B. 胀重于痛

C. 胀痛并重

D. 痛

E. 胀

137. 经行腹痛，属气滞者多见

138. 经行腹痛，属血瘀者多见

(139~140 题共用选项)

- A. 四君子汤
- B. 理中丸
- C. 逍遥散
- D. 天仙藤散
- E. 举元煎

139. 治疗脾胃虚弱型妇产科病证的代表方是

140. 治疗肝郁气滞型妇产科病证的代表方是

(141~142 题共用选项)

- A. 保阴煎
- B. 两地汤合二至丸
- C. 左归丸合二至丸
- D. 清经散
- E. 清热固经汤

141. 治疗肾阴虚型无排卵性异常子宫出血，应首选的方剂是

142. 治疗虚热型经期延长，应首选的方剂是

(143~144 题共用选项)

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- E. 8

143. 正常小儿会爬行的月龄是

144. 正常小儿会独坐的月龄是

(145~146 题共用选项)

- A. 肺脾
- B. 心肝
- C. 肺肝
- D. 肺肾
- E. 肺心

145. 感冒夹滞的病位在

146. 感冒夹惊的病位在

(147~148 题共用选项)

- A. 五味消毒饮合五皮饮
- B. 参苓白术散合玉屏风散
- C. 麻黄连翘赤小豆汤
- D. 温胆汤合附子泻心汤
- E. 龙胆泻肝汤合羚角钩藤汤

147. 急性肾炎变证水毒内闭证应首选的方剂是

148. 急性肾炎变证邪陷心肝证应首选的方剂是

(149~150 题共用选项)

- A. 宣毒发表汤
- B. 解肌透痧汤
- C. 透疹凉解汤
- D. 银翘散

E. 清解透表汤

149. 幼儿急疹邪郁肺卫证首选的方剂是

150. 麻疹见形期首选的方剂是

答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	A	E	D	A	C	E	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	B	D	E	D	E	D	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	A	D	B	B	A	C	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	D	E	C	D	C	C	C	D	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	C	D	C	A	A	C	B	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	C	B	A	A	A	D	B	E	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	B	C	E	B	E	C	B	B	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	A	E	C	B	E	E	E	E	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	B	C	B	C	D	A	C	A	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	C	B	A	B	B	C	B	E	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	B	C	B	E	B	C	A	D	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	D	B	A	D	A	D	A	E	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
B	E	A	B	A	E	A	D	E	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	B	A	D	A	C	B	A	A	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	E	C	A	B	D	E	D	E